

灌木,高约3米;小枝纤细,无毛,干时有纵皱纹。叶有小叶3—5;叶柄纤细,长2—7厘米,无毛;小叶片纸质,倒卵状椭圆形或椭圆状披针形,长5—12厘米,宽0.7—3厘米,中央的较大,两侧的较小,先端尾状渐尖,尖头长2—2.5厘米,呈镰刀状,基部楔形,两面均无毛,边缘全缘,侧脉通常5对,网脉两面微隆起;小叶柄长0.5—2厘米,中央的比两侧的略长,无毛。花未见。圆锥花序顶生,疏散;分枝细弱,有极稀疏的星状绒毛至无毛,长7—9厘米,伞房状排列在极短的主轴上;伞形果序几个或十几个瓦生于分枝上,有果实2—5;总花梗长1.5厘米,无毛;苞片早落;果梗纤细,长5—6毫米,无毛。果实球形,橙红色,有红色腺点,5室,直径约4毫米;无花柱,柱头5个;花盘隆起,长为果实的1/5—1/6。果期6月。

产云南西北部,少见。生于山谷常绿阔叶林林缘,海拔约1700米。模式标本采自云南贡山。

本种和云南鹅掌柴 *Schefflera yunnanensis* Li 及广西鹅掌柴 *Schefflera kwangsiensis* Merr. 极近似,但其小叶片先端为尾状渐尖。

我国广州栽培的吕宋鹅掌柴 *Schefflera microphylla* Merr. 与本种区别在于小叶片披针形,宽仅4—6毫米,先端非镰刀状。原产菲律宾,供观赏用。

11. 云南鹅掌柴

Schefflera yunnanensis Li in *Sargentia* 2: 32. 1942.

藤状灌木,附生,长3—10米。叶有5小叶;叶柄长5—6厘米,无毛;小叶片革质,倒卵状长圆形或卵形,长5.5厘米,宽2.5—3厘米,先端渐尖,基部阔楔形至圆形,下面灰白色,两面均无毛,边缘全缘,侧脉5—6对,和网脉在两面均微隆起;小叶柄无毛,不等长,中央的长1.5厘米,两侧的最短,长仅2—3毫米,其余介在两者之间。花未见。圆锥果序顶生;分枝3—4,伞房状排列,疏生星状绒毛,有总状排列的伞形果序2—7;果序梗长7毫米,果梗长4—7毫米,均疏生星状绒毛。果实卵球形,有5棱,有腺点,连隆起的花盘长约4毫米,直径约2.5毫米;花盘圆锥状,长为果实的1/3;无花柱,柱头5。果期4月。

产云南西北部。生于沟谷湿地,海拔1300米。模式标本采自怒江和独龙江分水岭。

李惠林在原记载中描述:“小叶柄不等长,中央的长1.5厘米,侧生的较短,长2—3厘米”,侧生小叶柄长2—3厘米显然是印刷上的错误。

12. 广西鹅掌柴 广西鸭脚木(广西植物名录)

Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li in *Sargentia* 2: 33. 1942.

灌木,高2米,有时攀援状;小枝干时有纵皱纹,无毛;节间短,长1—1.5厘米。叶