

灌木,高约3米;小枝纤细,无毛,干时有纵皱纹。叶有小叶3—5;叶柄纤细,长2—7厘米,无毛;小叶片纸质,倒卵状椭圆形或椭圆状披针形,长5—12厘米,宽0.7—3厘米,中央的较大,两侧的较小,先端尾状渐尖,尖头长2—2.5厘米,呈镰刀状,基部楔形,两面均无毛,边缘全缘,侧脉通常5对,网脉两面微隆起;小叶柄长0.5—2厘米,中央的比两侧的略长,无毛。花未见。圆锥花序顶生,疏散;分枝细弱,有极稀疏的星状绒毛至无毛,长7—9厘米,伞房状排列在极短的主轴上;伞形果序几个或十几个瓦生于分枝上,有果实2—5;总花梗长1.5厘米,无毛;苞片早落;果梗纤细,长5—6毫米,无毛。果实球形,橙红色,有红色腺点,5室,直径约4毫米;无花柱,柱头5个;花盘隆起,长为果实的1/5—1/6。果期6月。

产云南西北部,少见。生于山谷常绿阔叶林林缘,海拔约1700米。模式标本采自云南贡山。

本种和云南鹅掌柴 *Schefflera yunnanensis* Li 及广西鹅掌柴 *Schefflera kwangsiensis* Merr. 极近似,但其小叶片先端为尾状渐尖。

我国广州栽培的吕宋鹅掌柴 *Schefflera microphylla* Merr. 与本种区别在于小叶片披针形,宽仅4—6毫米,先端非镰刀状。原产菲律宾,供观赏用。

11. 云南鹅掌柴

Schefflera yunnanensis Li in *Sargentia* 2: 32. 1942.

藤状灌木,附生,长3—10米。叶有5小叶;叶柄长5—6厘米,无毛;小叶片革质,倒卵状长圆形或卵形,长5.5厘米,宽2.5—3厘米,先端渐尖,基部阔楔形至圆形,下面灰白色,两面均无毛,边缘全缘,侧脉5—6对,和网脉在两面均微隆起;小叶柄无毛,不等长,中央的长1.5厘米,两侧的最短,长仅2—3毫米,其余介在两者之间。花未见。圆锥果序顶生;分枝3—4,伞房状排列,疏生星状绒毛,有总状排列的伞形果序2—7;果序梗长7毫米,果梗长4—7毫米,均疏生星状绒毛。果实卵球形,有5棱,有腺点,连隆起的花盘长约4毫米,直径约2.5毫米;花盘圆锥状,长为果实的1/3;无花柱,柱头5。果期4月。

产云南西北部。生于沟谷湿地,海拔1300米。模式标本采自怒江和独龙江分水岭。

李惠林在原记载中描述:“小叶柄不等长,中央的长1.5厘米,侧生的较短,长2—3厘米”,侧生小叶柄长2—3厘米显然是印刷上的错误。

12. 广西鹅掌柴 广西鸭脚木(广西植物名录)

Schefflera kwangsiensis Merr. ex Li in *Sargentia* 2: 33. 1942.

灌木,高2米,有时攀援状;小枝干时有纵皱纹,无毛;节间短,长1—1.5厘米。叶

有小叶 5—7; 叶柄长 4—8 厘米, 幼时密生短柔毛, 很快变无毛; 小叶片革质, 长圆状披针形, 稀椭圆状长圆形, 长 6—9 厘米, 宽 1.5—3 厘米, 先端渐尖, 基部楔形, 两面均无毛, 边缘全缘, 反卷, 中脉仅下面隆起, 侧脉 5—6 对, 和稠密的网脉在两面甚明显而隆起; 小叶柄纤细, 长 0.5—2.5 厘米, 中央的较长, 两侧的较短, 被毛和叶柄一样。圆锥花序顶生, 长约 12 厘米; 分枝很少, 多少呈伞房状, 幼时被绒毛, 老时变稀至无毛; 伞形花序直径约 1 厘米, 总状排列在长约 7 厘米的分枝上; 总花梗长 1—1.5 厘米, 花梗长约 5 毫米, 均疏生星状绒毛; 萼长 1 毫米, 被毛或无毛, 边缘近全缘; 花瓣 5, 长约 2 毫米, 无毛; 雄蕊 5, 花丝长约 3.5 毫米; 子房 5 室; 无花柱, 柱头 5; 花盘稍隆起。果实卵形, 有 5 棱, 黄红色, 无毛, 连隆起的花盘长 6—7 毫米, 直径 5 毫米; 花盘五角形, 长为果实的 1/3。花期 4 月, 果期 5 月。

产广西(武鸣)、广东(广州栽培)。生于林下或石山上。模式标本采自广西扶绥。

本种广西民间称为七叶莲, 供药用, 治三叉神经痛、坐骨神经痛及神经性头痛等症。

本种习性和云南鹅掌柴 *Schefflera yunnanensis* Li 相似, 但本种果实卵球形, 较大, 可以区别。

13. 鹅掌藤(中国树木分类学) 七加皮(海南土名)

Schefflera arboricola Hay. Icon. Pl. Formos. 6: 23. 1916, as syn.; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 2: 139. 1927; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 524. f. 486. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 938. f. 832. 1937; Li in Sargentia 2: 33. 1942 & Woody Fl. Taiwan 670. 1963—*Heptapleurum arboricolum* Hay. l.c. 6: 23. 1916—*Heptapleurum sasakii* Hay. l.c. 6: pl. 4. 1916.

藤状灌木, 高 2—3 米; 小枝有不规则纵皱纹, 无毛。叶有小叶 7—9, 稀 5—6 或 10; 叶柄纤细, 长 12—18 厘米, 无毛; 托叶和叶柄基部合生成鞘状, 宿存或与叶柄一起脱落; 小叶片革质, 倒卵状长圆形或长圆形, 长 6—10 厘米, 宽 1.5—3.5 厘米, 先端急尖或钝形, 稀短渐尖, 基部渐狭或钝形, 上面深绿色, 有光泽, 下面灰绿色, 两面均无毛, 边缘全缘, 中脉仅在下面隆起, 侧脉 4—6 对, 和稠密的网脉在两面微隆起; 小叶柄有狭沟, 长 1.5—3 厘米, 无毛。圆锥花序顶生, 长 20 厘米以下, 主轴和分枝幼时密生星状绒毛, 后毛渐脱净; 伞形花序十几个至几十个总状排列在分枝上, 有花 3—10 朵; 苞片阔卵形, 长 0.5—1.5 厘米, 外面密生星状绒毛, 早落; 总花梗长不及 5 毫米, 花梗长 1.5—2.5 毫米, 均疏生星状绒毛; 花白色, 长约 3 毫米; 萼长约 1 毫米, 边缘全缘, 无毛; 花瓣 5—6, 有 3 脉, 无毛; 雄蕊和花瓣同数而等长; 子房 5—6 室; 无花柱, 柱头