

上,海拔 900—1500 米。越南、印度也有分布。

本种亦为民间草药,外用治跌打损伤、风湿性关节炎,常被误为鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hay. 而与之混用。

本种和鹅掌藤极相似,但叶常有小叶 5—7,小叶片最宽在中部,总花梗长 5 毫米以上,可以区别。

17. 球序鹅掌柴 团花鸭脚木(广西植物名录) 图版 5:3—5

Schefflera glomerulata Li in *Sargentia* 2: 32. f. 4. 1942; 中国高等植物图鉴 2: 1028. f. 3785. 1972.

乔木或灌木,高 3—7 米,稀缠绕藤本,长达 15 米。叶有小叶 5—7; 叶柄长 12—17 厘米,无毛;托叶和叶柄基部合生成鞘状,在叶柄脱落后尚宿存,最后也脱落;小叶片革质,倒卵状椭圆形、倒卵状长圆形,稀椭圆形或长圆状椭圆形,长 8—15 厘米,宽 3—5 厘米,先端渐尖,基部钝形或楔形,上面有光泽,下面灰绿色,两面均无毛,边缘全缘,侧脉通常 8 对,和稠密的网脉在两面微隆起;小叶柄有狭沟,长 3—5 厘米,无毛。圆锥花序顶生,长 15—30 厘米,主轴和分枝幼时有星状绒毛,后变稀至无毛;花无梗或有极短的梗,5—8 朵密集成簇;苞片早落;总花梗长约 5 毫米,疏生星状绒毛;萼长约 1 毫米,无毛,边缘全缘;花瓣 5,三角状长圆形或三角状卵形,长 1.5—2 毫米,无毛;雄蕊 5,花丝和花瓣等长;子房 5 室;无花柱,有不明显的柱头 5;花盘稍隆起。果实卵形,有 5 稜,连花盘长 4—5 毫米,直径约 3 毫米;花盘隆起成圆锥状,五角形,长为果实的 1/4—1/3;柱头明显。 花期 9 月,果期 9—10 月。

分布于贵州(兴义)、云南东南部、广西西部、广东(信宜)等地。生于谷地或山坡常绿阔叶林中,海拔 200—1400 米。模式标本采自云南。

本种主要特点是花近无梗,密集成簇。小叶片和密脉鹅掌柴 *Schefflera venulosa* (Wight & Arn.) Harms 很相似,如果没有花序区别时,彼此间就很容易混淆。

亚组 2. 离柱鹅掌柴亚组——Subsect. *Digitatae* Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1:132. 1965.

本亚组在我国仅有下列 1 种。

18. 离柱鹅掌柴 图版 5:6—8

图版 5: 1—2. 密脉鹅掌柴 *Schefflera venulosa* (Wight & Arn.) Harms, 1. 果枝; 2. 果实。3—5. 球序鹅掌柴 *Schefflera glomerulata* Li, 3. 叶; 4. 圆锥果序的一部分; 5. 果实。6—8. 离柱鹅掌柴 *Schefflera hypoleucoides* Harms, 6. 叶; 7. 圆锥果序的一部分; 8. 果实。



Schefflera hypoleuroides Harms in Fedde, Rep. Sp. Nov. 16: 246. 1919; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 186. 1924; Li in Sargentia 2: 19. 1942.

乔木, 高 7—15 米, 胸径达 30 厘米。叶有小叶 5—7; 叶柄粗壮, 最长达 38 厘米, 除基部被毛外均无毛; 小叶片革质, 中央的长圆形或长圆状椭圆形, 长 20—26 厘米, 宽 10—13 厘米, 两侧的卵形或卵状长圆形, 长 22—24 厘米, 宽 10—12 厘米, 有时较小, 先端渐尖, 基部钝形或阔圆形, 略偏斜, 上面有光泽, 无毛, 下面几无毛, 边缘全缘, 侧脉 10—16 对, 仅在下面隆起, 网脉两面稍明显; 小叶柄粗壮, 不等长, 中央的长 3—4 厘米, 两侧的长 1—2 厘米, 无毛。圆锥花序顶生, 主轴和分枝幼时有星状绒毛, 后脱稀至几无毛; 伞形花序有花数十朵, 单个顶生或几个总状排列在分枝上, 直径 1.5—2 厘米, 生在分枝顶端的往往较大, 直径达 3 厘米; 苞片长 2—5 毫米, 有绒毛; 总花梗长 1.5—2.5 厘米, 疏生星状短柔毛至几无毛; 花梗纤细, 长 4—5 毫米, 结实后可长至 1.5 厘米; 萼倒圆锥形, 有星状短柔毛, 边缘近全缘; 花瓣 5, 三角状卵形, 长 3 毫米, 外面被毛和萼一样, 但毛很快就脱净; 雄蕊 5, 露出花瓣之外; 子房 5 室; 花柱 5, 基部合生, 顶端离生, 直立。果实(未熟)几无毛, 长约 4 毫米; 宿存花柱长约 2 毫米, 中部以下合生, 上部离生, 反曲。花期 12 月。

产云南东南部。生于山谷中, 海拔约 2000 米。

本种最主要的特点是伞形花序组成圆锥花序, 花柱 5, 基部合生, 上部离生, 至结实时反曲。

亚组 3. 合柱鹅掌柴亚组——Subsect. Octophyllae Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 133. 1965.

本亚组在我国有下列 17 种。

19. **短序鹅掌柴** 川黔鸭脚木(广西植物名录) 图版 6: 1—5

Schefflera bodinieri (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 11: 166. 1930 & 15: 114. 1934; Li in Sargentia 2: 21. 1942; Lauener in Notes Bot. Gard. Edinb. 32: 94. 1972——*Heptapleurum bodinieri* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 24: 144. 1914 & Fl. Kouy-Tchéou 35. 1914.

灌木或小乔木, 高 1—5 米; 小枝棕紫色或红紫色, 被很快脱净星状短柔毛。叶有小叶 6—9, 稀 11; 叶柄长 9—18 厘米, 无毛; 小叶片膜质、薄纸质或坚纸质, 长圆状椭圆形、披针状椭圆形、披针形以至线状披针形, 长 11—15 厘米, 宽 1—5 厘米, 先端长渐尖, 尖头有时镰刀状, 基部阔楔形至钝形, 两面均无毛, 或下面有极稀疏白色星状短