

Schefflera hypoleuroides Harms in Fedde, Rep. Sp. Nov. 16: 246. 1919; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 186. 1924; Li in Sargentia 2: 19. 1942.

乔木, 高 7—15 米, 胸径达 30 厘米。叶有小叶 5—7; 叶柄粗壮, 最长达 38 厘米, 除基部被毛外均无毛; 小叶片革质, 中央的长圆形或长圆状椭圆形, 长 20—26 厘米, 宽 10—13 厘米, 两侧的卵形或卵状长圆形, 长 22—24 厘米, 宽 10—12 厘米, 有时较小, 先端渐尖, 基部钝形或阔圆形, 略偏斜, 上面有光泽, 无毛, 下面几无毛, 边缘全缘, 侧脉 10—16 对, 仅在下面隆起, 网脉两面稍明显; 小叶柄粗壮, 不等长, 中央的长 3—4 厘米, 两侧的长 1—2 厘米, 无毛。圆锥花序顶生, 主轴和分枝幼时有星状绒毛, 后脱稀至几无毛; 伞形花序有花数十朵, 单个顶生或几个总状排列在分枝上, 直径 1.5—2 厘米, 生在分枝顶端的往往较大, 直径达 3 厘米; 苞片长 2—5 毫米, 有绒毛; 总花梗长 1.5—2.5 厘米, 疏生星状短柔毛至几无毛; 花梗纤细, 长 4—5 毫米, 结实后可长至 1.5 厘米; 萼倒圆锥形, 有星状短柔毛, 边缘近全缘; 花瓣 5, 三角状卵形, 长 3 毫米, 外面被毛和萼一样, 但毛很快就脱净; 雄蕊 5, 露出花瓣之外; 子房 5 室; 花柱 5, 基部合生, 顶端离生, 直立。果实(未熟)几无毛, 长约 4 毫米; 宿存花柱长约 2 毫米, 中部以下合生, 上部离生, 反曲。花期 12 月。

产云南东南部。生于山谷中, 海拔约 2000 米。

本种最主要的特点是伞形花序组成圆锥花序, 花柱 5, 基部合生, 上部离生, 至结实时反曲。

亚组 3. 合柱鹅掌柴亚组——Subsect. Octophyllae Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 133. 1965.

本亚组在我国有下列 17 种。

19. **短序鹅掌柴** 川黔鸭脚木(广西植物名录) 图版 6: 1—5

Schefflera bodinieri (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 11: 166. 1930 & 15: 114. 1934; Li in Sargentia 2: 21. 1942; Lauener in Notes Bot. Gard. Edinb. 32: 94. 1972——*Heptapleurum bodinieri* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 24: 144. 1914 & Fl. Kouy-Tchéou 35. 1914.

灌木或小乔木, 高 1—5 米; 小枝棕紫色或红紫色, 被很快脱净星状短柔毛。叶有小叶 6—9, 稀 11; 叶柄长 9—18 厘米, 无毛; 小叶片膜质、薄纸质或坚纸质, 长圆状椭圆形、披针状椭圆形、披针形以至线状披针形, 长 11—15 厘米, 宽 1—5 厘米, 先端长渐尖, 尖头有时镰刀状, 基部阔楔形至钝形, 两面均无毛, 或下面有极稀疏白色星状短

柔毛,边缘疏生细锯齿或波状钝齿,稀全缘,中脉仅下面隆起,侧脉 5—16 对,上面隐约可见,下面较清晰,网脉不明显;小叶柄长 0.2—6 厘米,中央的较长,两侧的较短,无毛。圆锥花序顶生,长不超过 15 厘米(稀长达 30 厘米),主轴和分枝有灰白色星状短柔毛,不久毛脱稀变几无毛;伞形花序单个顶生或数个总状排列在分枝上,有花约 20 朵;苞片早落;总花梗长 1—2 厘米,花梗长 4—5 毫米,均疏生灰白色星状短柔毛;小苞片线状长圆形,长约 3 毫米,外面有毛,宿存;花白色;萼长 2—2.5 毫米,有灰白色星状短柔毛,边缘有 5 齿;花瓣 5,长约 3 毫米,有羽状脉纹,外面有灰白色星状短柔毛,毛很快脱净;雄蕊 5,略露出于花瓣之外;子房 5 室;花柱合生成柱状,长约 1 毫米,结实时长至 2 毫米以上;花盘略隆起。果实球形或近球形,几无毛,红色,直径 4—5 毫米。种子的胚乳稍嚼烂状。花期 11 月,果期次年 4 月。

分布四川(甘洛、南川)、湖北(来凤、利川)、贵州(遵义、习水、湄镇)、云南(广南、蒙自)和广西(凌云、乐业)。生于密林中,海拔 400—1000 米。模式标本采自贵州。

本种小叶片形状变异颇大,或全为线状披针形,或全为长圆状椭圆形,好像是两种不同植物,但有过渡类型,而且其花序、花以及果实都没有什么明显差别。最主要特点是幼枝通常带紫色,小叶片通常膜质或薄纸质,叶缘有细齿,花序短小,有灰白色星状短柔毛。

D. G. Frodin 在 Notes Bot. Gard. Edinb. **32**: 96. 1972 中将 L  veille 定名为 *Eleutherococcus bodinieri* 的种(载于 Bull. Acad. G  ogr. Bot. **24**: 144. 1914 & Fl. Kouy-Tch  ou 34. 1914), 新改名为 *Schefflera compacta* D. G. Frodin. A. Rehder 在 Journ. Arn. Arb. **15**: 115. 1934 已将 L  veille 的种改隶鹅掌柴属,并怀疑它是一个新种。但他也指出与本种很近似,不过是叶有小叶 3—6,小叶片椭圆形至长圆形,较宽的小叶片边缘有锯齿,窄狭的小叶片全缘。这些都是本种具有的特征,与本种没有什么明显区别。

20. 小叶鹅掌柴

Schefflera parvifoliolata Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 **1**: 136. 1965.

灌木,高 5 米;小枝粗壮,淡棕紫色,当年生枝疏生锈色星状绒毛。叶有小叶 7—10;叶柄长 8—13 厘米,无毛;小叶片革质,线状长圆形,中央的长约 8 厘米,宽 1.5—1.7 厘米,两侧的长约 4 厘米,宽 1 厘米,其余介在两者之间,先端急尖或短渐尖,基部阔楔形至近圆形,两面均无毛,边缘全缘或近先端处有疏离的细锯齿 2—4,中脉在上面平坦,下面稍隆起,侧脉纤细,约 10 对,隐约不明,网脉不明显;小叶柄长 0.5—2.3 厘米。圆锥花序顶生,长约 10 厘米,疏散,主轴和分枝密生锈红色星状绒毛;伞形花

