

Li in *Sargentia* 2: 23. 1942——*Heptapleurum productum* Dunn in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 35: 499. 1903.

灌木，高 1.5—3 米。叶有小叶 5—11 (通常为 7—9)；叶柄长 20 厘米，无毛；小叶片纸质，卵状披针形，长 8—15 厘米，宽 3—5 厘米，中央的较大，两侧的较小，先端长渐尖，基部阔楔形或圆形，两面均无毛，边缘疏生锯齿，反卷，侧脉 6—10 对，上面明显，下面微隆起，网脉上面微下陷；小叶柄长 1.5—3.5 厘米，中央的比两侧的长。圆锥花序顶生，幼时有白色或锈色绒毛，后变无毛；伞形花序总状排列在分枝上，直径约 3 厘米，有花多数；总花梗长 2—3.5 厘米，有绒毛；萼密生绒毛，边缘有 5 钝齿；花瓣 5，长 3 毫米，外面疏生绒毛，里面无毛；雄蕊 5，花丝长 3 毫米；子房 5 室；花柱合生成短柱，长 1.5 毫米；花盘扁平。

产云南、贵州，根据文献描述，未见到标本。

24. 金平鹅掌柴

Schefflera chinpinensis Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 135. 1965.

灌木，高 4—5 米；小枝粗壮，无毛。叶有 6 小叶；叶柄粗壮，长约 40 厘米，有极稀疏的星状短柔毛；小叶片卵状长圆形、椭圆形或卵形，长约 30 厘米，宽约 11 厘米，先端尾状渐尖，基部圆形，上面无毛，下面有稀疏的星状短柔毛，边缘全缘，中脉两面均隆起，侧脉约 13 对，仅下面隆起，网脉微隆起；小叶柄长 1.5—6 厘米，几无毛。圆锥花序顶生，长约 28 厘米，主轴和分枝密生星状短柔毛；伞形花序有花 10—20 朵，10—20 个总状排列于分枝上；总花梗长 1.5—2 厘米，花梗长 1.5—4 毫米，均密生星状短柔毛；苞片长圆形，早落；小苞片线形；花紫红色 (根据野外记录)；花芽近球形，长约 2 毫米；萼疏生星状短柔毛，边缘近全缘或有 5 小齿；花瓣 5，长约 2 毫米，外面疏生星状短柔毛至无毛；雄蕊 5，长约 4 毫米；子房 5 室；花柱合生成短柱，长约 0.2 毫米；花盘稍隆起。

产云南东南部。生于潮湿疏林下，也生于阳坡路旁，海拔 500 米。模式标本采自云南金平。

本种最显著的特点是花紫红色，花柱粗短，小叶片大，下面疏生星状短柔毛。

25. 大叶鹅掌柴

Schefflera macrophylla (Dunn) Vig. in *Ann. Sci. Nat. 9. Bot.* 9: 330. 1909;

图版 6: 1—5. 短序鹅掌柴 *Schefflera bodinieri* (Lévl.) Rehd., 1. 花枝; 2. 狭型叶; 3. 花; 4. 子房横切面; 5. 果实。6—10. 鹅掌柴 *Schefflera octophylla* (Lour.) Harms, 6. 叶; 7. 圆锥花序的一部分; 8. 花; 9. 子房横切面; 10. 果实。11—13. 星毛鸭脚木 *Schefflera minutistellata* Merr. ex Li, 11. 叶; 12. 圆锥花序的一部分; 13. 果实。