

Li in *Sargentia* 2: 23. 1942——*Heptapleurum productum* Dunn in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 35: 499. 1903.

灌木，高 1.5—3 米。叶有小叶 5—11 (通常为 7—9)；叶柄长 20 厘米，无毛；小叶片纸质，卵状披针形，长 8—15 厘米，宽 3—5 厘米，中央的较大，两侧的较小，先端长渐尖，基部阔楔形或圆形，两面均无毛，边缘疏生锯齿，反卷，侧脉 6—10 对，上面明显，下面微隆起，网脉上面微下陷；小叶柄长 1.5—3.5 厘米，中央的比两侧的长。圆锥花序顶生，幼时有白色或锈色绒毛，后变无毛；伞形花序总状排列在分枝上，直径约 3 厘米，有花多数；总花梗长 2—3.5 厘米，有绒毛；萼密生绒毛，边缘有 5 钝齿；花瓣 5，长 3 毫米，外面疏生绒毛，里面无毛；雄蕊 5，花丝长 3 毫米；子房 5 室；花柱合生成短柱，长 1.5 毫米；花盘扁平。

产云南、贵州，根据文献描述，未见到标本。

24. 金平鹅掌柴

Schefflera chinpinensis Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 135. 1965.

灌木，高 4—5 米；小枝粗壮，无毛。叶有 6 小叶；叶柄粗壮，长约 40 厘米，有极稀疏的星状短柔毛；小叶片卵状长圆形、椭圆形或卵形，长约 30 厘米，宽约 11 厘米，先端尾状渐尖，基部圆形，上面无毛，下面有稀疏的星状短柔毛，边缘全缘，中脉两面均隆起，侧脉约 13 对，仅下面隆起，网脉微隆起；小叶柄长 1.5—6 厘米，几无毛。圆锥花序顶生，长约 28 厘米，主轴和分枝密生星状短柔毛；伞形花序有花 10—20 朵，10—20 个总状排列于分枝上；总花梗长 1.5—2 厘米，花梗长 1.5—4 毫米，均密生星状短柔毛；苞片长圆形，早落；小苞片线形；花紫红色 (根据野外记录)；花芽近球形，长约 2 毫米；萼疏生星状短柔毛，边缘近全缘或有 5 小齿；花瓣 5，长约 2 毫米，外面疏生星状短柔毛至无毛；雄蕊 5，长约 4 毫米；子房 5 室；花柱合生成短柱，长约 0.2 毫米；花盘稍隆起。

产云南东南部。生于潮湿疏林下，也生于阳坡路旁，海拔 500 米。模式标本采自云南金平。

本种最显著的特点是花紫红色，花柱粗短，小叶片大，下面疏生星状短柔毛。

25. 大叶鹅掌柴

Schefflera macrophylla (Dunn) Vig. in *Ann. Sci. Nat. 9. Bot.* 9: 330. 1909;

图版 6: 1—5. 短序鹅掌柴 *Schefflera bodinieri* (Lévl.) Rehd., 1. 花枝; 2. 狭型叶; 3. 花; 4. 子房横切面; 5. 果实。6—10. 鹅掌柴 *Schefflera octophylla* (Lour.) Harms, 6. 叶; 7. 圆锥花序的一部分; 8. 花; 9. 子房横切面; 10. 果实。11—13. 星毛鸭脚木 *Schefflera minutistellata* Merr. ex Li, 11. 叶; 12. 圆锥花序的一部分; 13. 果实。

钟心煊, 科学社丛刊 **1**: 186. 1924; Li in *Sargentia* **2**: 22. 1942 — *Heptapleurum macrophyllum* Dunn in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **35**: 499. 1903.

乔木, 高达 10 米。叶有长柄, 有 7 小叶; 小叶片革质或薄革质, 卵状长圆形, 长 20—40 厘米, 最长至 55 厘米, 宽 8—15 厘米, 最宽至 25 厘米, 中央的较大, 两侧的较小, 先端短渐尖至渐尖, 基部阔圆形, 上面无毛, 下面密生灰白色绒毛, 有时杂生黄锈色绒毛, 边缘全缘或有时疏生极不明显的细锯齿, 中脉两面隆起, 侧脉 10—12 对, 下面微隆起, 网脉稍明显; 小叶柄粗壮, 稍扁, 长 7—15 厘米, 中央的较长, 两侧的较短, 疏生星状绒毛。圆锥花序顶生, 长达 50 厘米, 主轴和分枝幼时密生锈色星状绒毛, 后毛渐变稀; 伞形花序有花数十朵; 总花梗扁平, 长约 1 厘米, 密生黄锈色星状短柔毛; 苞片长 5—10 毫米, 外面密生星状绒毛; 小苞片长约 3 毫米, 被毛和苞片一样; 萼有星状短柔毛, 边缘有 5 齿; 花瓣 5, 长约 2 毫米, 外面被很快脱落星状短柔毛; 雄蕊 5, 约与花瓣等长; 子房 5 室; 花柱合生成短柱, 长不及 1 毫米。花期 9 月。

产云南(临沧、福贡), 少见。生于山谷密林中, 海拔 1900—2000 米。模式标本采自云南思茅。

本种最显著的特点是小叶片很大, 下面密生灰白色或黄锈色绒毛, 圆锥花序很大, 花瓣有毛。

26. **鹅掌柴**(中国树木分类学) 鸭母树(种子植物名称)、鸭脚木(广东、广西土名) 图版 6: 6—10

Schefflera octophylla (Lour.) Harms in *Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.* **3**(8): 38. 1894; Vig. in *Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine* **2**: 1178. pl. 139 no. 5—7 1923; 钟心煊, 科学社丛刊 **1**: 186. 1924; Merr. in *Lingnan Sci. Journ.* **5**: 139. 1927; Kanehira, *Formos. Trees* rev. ed. 527. f. 526. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 937. f. 830. 1937; Li in *Sargentia* **2**: 20. 1942 & Woody *Fl. Taiwan* 671. f. 278. 1963; 侯宽昭等, 广州植物志 458. 1956; 林来官, 福建师院学报第一期下卷 143. 1959; 中国高等植物图鉴 **2**: 1028. f. 3786. 1972 — *Aralia octophylla* Lour. *Fl. Cochinch.* 187. 1790 & in ed. Willd. 233. 1793 — *Paratropia cantoniensis* Hook. & Arn. *Bot. Beechey Voy.* 189. 1841; Benth. *Fl. Hongk.* 136. 1861 — *Agalma octophyllum* Seem. in *Journ. Bot.* **2**: 298 (Revis. Heder. 24. 1868) 1864 — *Heptapleurum octophyllum* Benth. ex Hance in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **13**: 105. 1873; Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **23**: 342. 1888; Dunn & Tutch. in *Kew Bull. Misc. Inform. add. ser.* **10**: 119. 1912 — *Agalma lutchucense* Nakai in *Journ.*