

几无毛;小苞片很小,被毛和苞片一样;萼长4毫米,边缘近全缘或有5—6小齿,无毛;花瓣5—6,长圆形,长3毫米,无毛;雄蕊5—6,稍露出花瓣之外;子房5—6室;花柱合生成柱状,长1.5毫米;花盘扁平。花期2月。

产云南。生于密林中,海拔约1000米。模式标本采于云南麻栗坡。

本种体形和粉背鹅掌柴 *Schefflera insignis* C. N. Ho 及白背鹅掌柴 *Schefflera hypoleuca* (Kurz) Harms 相近,和前者的区别在于本种小叶片下面和花序都被锈色星状绒毛,伞形花序的花较少;和后者区别在于本种花瓣无毛,小叶片下面被锈色星状绒毛,决不呈灰白色。

28. **星毛鸭脚木**(中国高等植物图鉴) 微星毛鸭母树(福建师范学院学报),小星鸭脚木(广西植物名录),鸭麻木(广东土名) 图版6:11—13

Schefflera minutistellata Merr. ex Li in *Sargentia* 2: 24. 1942; 林来官,福建师院学报第一期下卷 146. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 1029. f. 3787. 1972.

灌木或小乔木,高2—6米;当年生的小枝粗壮,密生黄棕色星状绒毛,不久毛即脱净;髓白色,薄片状。叶有小叶7—15;叶柄长12—45厘米,最长可达66厘米,幼时密生星状绒毛,后变无毛;小叶片纸质至薄革质,卵状披针形至长圆状披针形,稀长圆状椭圆形,长10—16厘米或更长,宽4—6厘米,先端急尖至渐尖,基部钝形至圆形,稍歪斜,上面无毛,下面密生灰色小星状绒毛,老时脱稀至无毛,边缘全缘,稍反卷,有时近先端有细齿,侧脉6—10对,上面平坦,下面微隆起,网脉上面不明显至略明显,下面不明显;小叶柄极不等长,中央的长3—7厘米,两侧的长1—1.5厘米,被毛和叶柄一样。圆锥花序顶生,长20—40厘米,主轴和分枝幼时密生黄棕色星状绒毛,后毛渐脱稀而呈淡黄灰色;分枝疏散,上部的较短,长4—8厘米,往往只在顶端着生伞形花序1个,下部的较长,最长达30厘米,顶端也有较大的伞形花序1个,直径约2厘米,其下有较小的伞形花序几个至十几个;伞形花序有花10—30朵;总花梗长2.5—3厘米,和花梗、萼多少被淡黄灰色星状绒毛;苞片三角形,长2—3毫米;花梗长5—6毫米,结实时可长至1厘米;萼倒圆锥形,长1.5—2毫米;萼齿5,三角形;花瓣三角形至三角状卵形,长2—3毫米,无毛;雄蕊5,花丝长3—4毫米;子房5室;花柱合生成柱状,长1毫米;花盘扁平。果实球形,有5稜,直径4毫米,有毛或几无毛,有宿存的萼齿;宿存花柱长约2毫米,柱头头状。花期9月,果期10月。

广布于云南、贵州、湖南、广西、广东、江西(上犹、龙南)和福建(南靖)。生于山地密林或疏林中,海拔1000—1800米。模式标本采自广东乐昌。

本种体形像白背鹅掌柴 *Schefflera hypoleuca* (Kurz) Harms, 但本种小叶较多,通

常7个以上,小叶片长圆状披针形或卵状披针形,伞形花序直径较小,花瓣无毛。

29. 狭叶鹅掌柴 狭叶鸭脚木(植物分类学报)

Schefflera angustifoliolata C. N. Ho, 植物分类学报 2: 71. pl. 2. 1952.

灌木或乔木。叶有小叶8—11;叶柄长约30厘米,无毛;小叶片纸质,狭披针形、倒披针形或长圆状披针形,略呈镰刀状,长12—18厘米,宽2—4厘米,先端渐尖,基部楔形或钝形,稍歪斜,上面无毛,下面疏生星状绒毛,边缘全缘,有时有锯齿,中脉两面微隆起,网脉不很明显;小叶柄长1.5—8.5厘米,中央的较长,两侧的较短,无毛。圆锥花序顶生,长达40厘米以上,主轴和分枝幼时有星状绒毛,后毛渐脱稀至无毛;伞形花序有花15—30朵,十几个疏散排列在分枝上;总花梗长1—3厘米,有星状绒毛;苞片三角形,长3—5毫米,先端2裂,中脉延伸成芒状,外面幼时被毛,不久毛渐脱净;花梗长2—3毫米;小苞片很小,长约1毫米,被毛;萼倒圆锥形,密生星状绒毛,长约1.5毫米,边缘有5钝齿;花瓣5,长约2毫米,无毛;雄蕊5;子房5室;花柱合生成短柱,长1毫米;花盘隆起。花期10月。

产广东(云浮、信宜)。生于溪边湿地,海拔1150米。模式标本采自广东云浮。

本种最主要特点是小叶片通常为狭披针形,多少呈镰刀状,下面灰白色而被星状绒毛,圆锥花序大而疏散。

30. 白背鹅掌柴

Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 38. 1894; Li in Sargentia 2: 24. 1942 ——*Heptapleurum hypoleucum* Kurz in For. Fl. Brit. Burma 1: 539. 1877; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 728. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 454. 1911.

小乔木,高5—10米。叶有7小叶;叶柄细长,长约30厘米,无毛;小叶片革质,卵形或长圆形,长12—20厘米,宽4—11厘米,中央的较大,两侧的较小,先端急尖,基部圆形,上面无毛,下面粉绿色,有时疏生星状绒毛,边缘全缘或有锯齿或分裂,侧脉8—12对,上面明显,下面微隆起,网脉略明显;小叶柄长1—8厘米,中央的较长,两侧的较短。圆锥花序顶生,长30—40厘米,下部的分枝通常成复花序,有星状绒毛或无毛;伞形花序直径3—3.5厘米,有花多数;总花梗长2.5厘米,和花梗均有绒毛;小苞片三角形,长2—3毫米;花梗长0.8—1.4厘米;萼密生星状绒毛,边缘有5小齿;花瓣5,长2—3毫米,外面疏生星状绒毛;雄蕊5,花丝长3毫米;子房5室,花柱合生成柱状,柱头明显,花盘扁平。花期1月。

产云南(麻栗坡),少见。生密林中,海拔1300米。印度和缅甸也有分布。

