

常 7 个以上,小叶片长圆状披针形或卵状披针形,伞形花序直径较小,花瓣无毛。

29. 狭叶鹅掌柴 狭叶鸭脚木(植物分类学报)

Schefflera angustifoliolata C. N. Ho, 植物分类学报 2: 71. pl. 2. 1952.

灌木或乔木。叶有小叶 8—11; 叶柄长约 30 厘米,无毛;小叶片纸质,狭披针形、倒披针形或长圆状披针形,略呈镰刀状,长 12—18 厘米,宽 2—4 厘米,先端渐尖,基部楔形或钝形,稍歪斜,上面无毛,下面疏生星状绒毛,边缘全缘,有时有锯齿,中脉两面微隆起,网脉不很明显;小叶柄长 1.5—8.5 厘米,中央的较长,两侧的较短,无毛。圆锥花序顶生,长达 40 厘米以上,主轴和分枝幼时有星状绒毛,后毛渐脱稀至无毛;伞形花序有花 15—30 朵,十几个疏散排列在分枝上;总花梗长 1—3 厘米,有星状绒毛;苞片三角形,长 3—5 毫米,先端 2 裂,中脉延伸成芒状,外面幼时被毛,不久毛渐脱净;花梗长 2—3 毫米;小苞片很小,长约 1 毫米,被毛;萼倒圆锥形,密生星状绒毛,长约 1.5 毫米,边缘有 5 钝齿;花瓣 5,长约 2 毫米,无毛;雄蕊 5;子房 5 室;花柱合生成短柱,长 1 毫米;花盘隆起。 花期 10 月。

产广东(云浮、信宜)。生于溪边湿地,海拔 1150 米。模式标本采自广东云浮。

本种最主要特点是小叶片通常为狭披针形,多少呈镰刀状,下面灰白色而被星状绒毛,圆锥花序大而疏散。

30. 白背鹅掌柴

Schefflera hypoleuca (Kurz) Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 38. 1894; Li in Sargentia 2: 24. 1942 ——*Heptapleurum hypoleucum* Kurz in For. Fl. Brit. Burma 1: 539. 1877; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 728. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 454. 1911.

小乔木,高 5—10 米。叶有 7 小叶;叶柄细长,长约 30 厘米,无毛;小叶片革质,卵形或长圆形,长 12—20 厘米,宽 4—11 厘米,中央的较大,两侧的较小,先端急尖,基部圆形,上面无毛,下面粉绿色,有时疏生星状绒毛,边缘全缘或有锯齿或分裂,侧脉 8—12 对,上面明显,下面微隆起,网脉略明显;小叶柄长 1—8 厘米,中央的较长,两侧的较短。圆锥花序顶生,长 30—40 厘米,下部的分枝通常成复花序,有星状绒毛或无毛;伞形花序直径 3—3.5 厘米,有花多数;总花梗长 2.5 厘米,和花梗均有绒毛;小苞片三角形,长 2—3 毫米;花梗长 0.8—1.4 厘米;萼密生星状绒毛,边缘有 5 小齿;花瓣 5,长 2—3 毫米,外面疏生星状绒毛;雄蕊 5,花丝长 3 毫米;子房 5 室,花柱合生成柱状,柱头明显,花盘扁平。 花期 1 月。

产云南(麻栗坡),少见。生密林中,海拔 1300 米。印度和缅甸也有分布。

本种主要特点在于小叶柄极不等长,小叶片长圆形,背面通常无毛而呈粉绿色。

31. 高鹅掌柴

Schefflera elata (C. B. Clarke) Harms in Engl. & Prantl, Nat Pflanzenfam. 3(8): 38. 1894; Li in Sargentia 2: 23. 1942, pro parte — *Hedera elata* Ham. in D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 187. 1825 — *Agalma elatum* Seem. in Journ. Bot. 2: 298. 1864 — *Heptapleurum elatum* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 728. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 454. 1911.

乔木。叶有小叶 6—7; 叶柄长至 35 厘米,无毛;小叶片硬纸质,长圆状披针形,长 20—23 厘米,宽 5.5—6.5 厘米,有时稍小,先端渐尖,尖头稍呈镰刀形,基部钝形,上面有光泽,两面均无毛或下面沿中脉疏生星状毛,边缘全缘,稍反卷,中脉上面微隆起,下面隆起,侧脉 8—15 对,上面不明显,下面明显,网脉在上面不明显,下面隐约可见;小叶柄不等长,中央的长 4—5 厘米,两侧的长 2 厘米,无毛。花未见。圆锥花序顶生,大而疏散,主轴和分枝疏生星状短柔毛;伞形果序疏散地总状排列在分枝上,有果实 10—15;果序梗长 2—2.5 厘米,和果梗均疏生星状短柔毛;苞片和小苞片很小。果实倒卵球形,有 5 棱,直径 4 毫米,长 5 毫米,5 室;花盘隆起,直径约 3 毫米;宿存花柱长 2 毫米;果梗长 8—14 毫米。

产云南。不丹、尼泊尔、印度也有分布。

李惠林在 Sargentia 2: 23. 1942 引证俞德浚 19477 号及 Henry 13474 号标本,他的描述就是混合这两号标本而成。但俞德浚 19477 号标本为粗芽鹅掌柴 *Schefflera yui* Tseng & Hoo, 而 Henry 13474 号的标本照片,其小叶片为长圆状椭圆形,最宽在中部,花柱极粗短,极像鹅掌柴 *Schefflera octophylla* (Lour.) Harms。蔡希陶 57027 号标本和 C. B. Clarke 在《印度植物志》的描述除果梗较短外,其余特征大体符合,本种就是以这号标本作为基础描述的。

32. 红花鹅掌柴

Schefflera rubriflora Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 139. 1965 — *Schefflera octophylla* auct. non Harms: Li in Sargentia 2: 21. 1942, pro parte.

乔木,高约 7 米;小枝粗壮,疏生星状绒毛,髓实心。叶有小叶 7—8;叶柄长 25—35 厘米,无毛;小叶片纸质,长圆状披针形,中央的较大,长 24 厘米,宽 8 厘米,两侧的较小,长 10—11 厘米,宽 3 厘米,其余介在两者之间,先端尾状渐尖,尖头长 1.5—2 厘米,略呈镰刀状,基部钝形至圆形,干时上面棕色,下面淡棕色,两面均无毛,边缘全缘,中脉上面平坦,下面比上面明显,网脉两面均不明显;小叶柄不等长,中央的