

本种主要特点在于小叶柄极不等长,小叶片长圆形,背面通常无毛而呈粉绿色。

31. 高鹅掌柴

Schefflera elata (C. B. Clarke) Harms in Engl. & Prantl, Nat Pflanzenfam. 3(8): 38. 1894; Li in Sargentia 2: 23. 1942, pro parte — *Hedera elata* Ham. in D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 187. 1825 — *Agalma elatum* Seem. in Journ. Bot. 2: 298. 1864 — *Heptapleurum elatum* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 728. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 454. 1911.

乔木。叶有小叶 6—7; 叶柄长至 35 厘米,无毛;小叶片硬纸质,长圆状披针形,长 20—23 厘米,宽 5.5—6.5 厘米,有时稍小,先端渐尖,尖头稍呈镰刀形,基部钝形,上面有光泽,两面均无毛或下面沿中脉疏生星状毛,边缘全缘,稍反卷,中脉上面微隆起,下面隆起,侧脉 8—15 对,上面不明显,下面明显,网脉在上面不明显,下面隐约可见;小叶柄不等长,中央的长 4—5 厘米,两侧的长 2 厘米,无毛。花未见。圆锥花序顶生,大而疏散,主轴和分枝疏生星状短柔毛;伞形果序疏散地总状排列在分枝上,有果实 10—15;果序梗长 2—2.5 厘米,和果梗均疏生星状短柔毛;苞片和小苞片很小。果实倒卵球形,有 5 棱,直径 4 毫米,长 5 毫米,5 室;花盘隆起,直径约 3 毫米;宿存花柱长 2 毫米;果梗长 8—14 毫米。

产云南。不丹、尼泊尔、印度也有分布。

李惠林在 Sargentia 2: 23. 1942 引证俞德浚 19477 号及 Henry 13474 号标本,他的描述就是混合这两号标本而成。但俞德浚 19477 号标本为粗芽鹅掌柴 *Schefflera yui* Tseng & Hoo, 而 Henry 13474 号的标本照片,其小叶片为长圆状椭圆形,最宽在中部,花柱极粗短,极像鹅掌柴 *Schefflera octophylla* (Lour.) Harms。蔡希陶 57027 号标本和 C. B. Clarke 在《印度植物志》的描述除果梗较短外,其余特征大体符合,本种就是以这号标本作为基础描述的。

32. 红花鹅掌柴

Schefflera rubriflora Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 139. 1965 — *Schefflera octophylla* auct. non Harms: Li in Sargentia 2: 21. 1942, pro parte.

乔木,高约 7 米;小枝粗壮,疏生星状绒毛,髓实心。叶有小叶 7—8;叶柄长 25—35 厘米,无毛;小叶片纸质,长圆状披针形,中央的较大,长 24 厘米,宽 8 厘米,两侧的较小,长 10—11 厘米,宽 3 厘米,其余介在两者之间,先端尾状渐尖,尖头长 1.5—2 厘米,略呈镰刀状,基部钝形至圆形,干时上面棕色,下面淡棕色,两面均无毛,边缘全缘,中脉上面平坦,下面比上面明显,网脉两面均不明显;小叶柄不等长,中央的