

或椭圆形,中央的较大,长13—15厘米,宽7—9厘米,两侧的较小,长约11厘米,宽5厘米,先端急尖,基部钝形或近圆形,两面均无毛,中脉仅下面隆起,侧脉7—10对,上面明显,下面微隆起,网脉不明显;小叶柄无毛,长4—6厘米,中央的较长,两侧的较短。圆锥花序顶生,长约30厘米,主轴和分枝疏生星状短柔毛至无毛,分枝长3—9厘米,在花序下部的较长,上部的较短;伞形花序单个顶生,或2—3个总状排列在分枝上,直径2—3厘米,有花15—30朵;苞片三角形,长2—4毫米,幼时被毛,后毛渐脱净;总花梗长2—2.5毫米,几无毛;花梗长5—8毫米,有星状短柔毛;萼倒圆锥形,长2毫米,有星状短柔毛,边缘近全缘;花瓣5,三角形,长3毫米,无毛;雄蕊5,花丝和花瓣等长或稍短;子房5室;花柱合生成柱状,长约1毫米。 花期10—11月。

产广东。生于溪边。模式标本采自广东阳春。

本种体形很象白背鹅掌柴 *Schefflera hypoleuca* (Kurz) Harms 及星毛鸭脚木 *Schefflera minutistellata* Merr. ex Li, 但本种小叶片长圆状椭圆形,下面无毛,容易区别。

35. 多核鹅掌柴 鸭脚、泡桐(云南土名) 图版7:1—6

Schefflera polypyrena Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 139. 1965.

乔木或灌木,高4—10米;小枝粗壮,无毛,髓实心。叶有5—7小叶;叶柄长19—27厘米,无毛;小叶片纸质,长圆形或长圆状椭圆形,长10—16厘米,宽4.5—6.5厘米,先端短渐尖,基部阔楔形至圆形,稍歪斜,干时上面黑棕色,下面棕色,两面均无毛,中脉和侧脉在上面平坦,下面隆起,侧脉8—11对,网脉不明显;小叶柄不等长,中央的长4—5厘米,两侧的长1—1.5厘米,无毛。圆锥花序侧生,主轴和分枝幼时有小横裂的栓质薄皮,后呈秕糠状或鳞片状脱落,脱净的部分变黑色,分枝二叉式;伞形花序总状排列在分枝上,直径1.5—2厘米,有花8—10朵;总花梗扁平,长1.5—2厘米;苞片阔三角形,长3—4毫米;花梗长1—2毫米;小苞片三角状卵形,长约2毫米;花芽椭圆形,长约6毫米;萼阔钟形,长约3毫米,边缘呈微啮蚀状;花瓣7—10,长三角形,长约4毫米,干时黑色,无毛;雄蕊和花瓣同数而等长,花丝基部膨大,上部细尖;子房7—11室;花柱合生成柱状,长约1.5毫米;花盘隆起。果实球形,干时黑色,有明显的7—11稜,直径4毫米;花柱宿存,柱头头状;果梗很短,长仅1—2毫米;分枝7—11,扁平。 花期10月,果期次年3月。

产云南(屏边、西畴)。生于疏林中较湿润处,海拔800—1300米。模式标本采自云南屏边。

本种叶有5—7小叶,干时黑棕色,圆锥花序侧生,花7—11数,果实有多稜,果梗

粗短，为国产的鹅掌柴属最独特者。它和印度尼西亚产的 *Schefflera singalangensis* Ridl. 相近，但那种植物为附生藤本，小叶片椭圆形且较大。

组 3. 头序鹅掌柴组——Sect. *Cephaloschefflera* Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 36. 1894——Sect. *Brassaia* (Endl.) Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1:133. 1965, syn. nov.

本组在我国有下列 2 种。

36. 五柱鹅掌柴 图版 7:7—9

Schefflera pentagyra Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 140. 1965 —— *Schefflera wangii* Li in Sargentia 2: 18. 1942, pro parte.

小乔木，高 5 米。叶有小叶 6—7；叶柄长 35—40 厘米，无毛；小叶片革质，长圆状椭圆形，长 17—23 厘米，宽 8—12 厘米，先端钝形而有短的尖头，稀渐尖，基部近圆形，两面均无毛，边缘在中部以上疏生不规则的锯齿，齿尖彼此距离约 1 厘米，侧脉 8—10 对，和中脉在上面平坦，下面隆起，网脉干时上面稍下陷，下面隆起；小叶柄长 4—6 厘米，无毛。完整的花序未见；分枝近横生或斜生，长 3—7 厘米，疏生星状绒毛，顶端着生头状果序 1 个；头状果序紧密，球形，直径约 1.5—2 厘米，有果实多数；苞片早落；小苞片线状披针形，长 3—4 毫米，外面密生绒毛；花(根据果序上残留的)无梗或近无梗，长约 4 毫米；萼密生绒毛，有 5 个三角形小齿；花瓣 5，革质，三角形，长约 2 毫米，外面有绒毛；雄蕊 5，花丝甚短；子房 5 室；花柱 5，长约 1.2 毫米，离生。果实近球形，有 5 稜，直径约 5 毫米，长 4 毫米，几无毛；宿存花柱离生几至基部，反曲；花盘平坦，直径约 2 毫米；果梗长约 3 毫米。果期 2 月。

产云南。生于山谷密林中，海拔 2700 米。模式标本采自云南凤庆。

本种花密集成头状花序，花柱离生，叶缘有疏生锯齿，与国产本属其他有头状花序的种类容易区别。它和印度产的 *Schefflera cephalotes* (C. B. Clarke) Harms 相近，但那种植物的小叶片较大，全缘，果实长圆形，有 5—8 稜，无小苞片，花盘在结实后也较大。

37. 中华鹅掌柴 图版 7:10—17

Schefflera chinensis (Dunn) Li in Sargentia 2: 17. f. 1. 1942; 何景、曾沧江, 植物分类学报增刊 1: 141. 1965 —— *Oreopanax chinensis* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 500. 1903; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 186. 1924 —— *Schefflera wangii* Li, l.c. 2: 18. 1942, pro parte.

乔木，高 5—10 米。叶有小叶 6—7；叶柄长 10—30 厘米，无毛；小叶片革质，中

