

粗短，为国产的鹅掌柴属最独特者。它和印度尼西亚产的 *Schefflera singalangensis* Ridl. 相近，但那种植物为附生藤本，小叶片椭圆形且较大。

组 3. 头序鹅掌柴组——Sect. *Cephaloschefflera* Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 36. 1894——Sect. *Brassaia* (Endl.) Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1:133. 1965, syn. nov.

本组在我国有下列 2 种。

36. 五柱鹅掌柴 图版 7:7—9

Schefflera pentagyra Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 140. 1965 —— *Schefflera wangii* Li in Sargentia 2: 18. 1942, pro parte.

小乔木，高 5 米。叶有小叶 6—7；叶柄长 35—40 厘米，无毛；小叶片革质，长圆状椭圆形，长 17—23 厘米，宽 8—12 厘米，先端钝形而有短的尖头，稀渐尖，基部近圆形，两面均无毛，边缘在中部以上疏生不规则的锯齿，齿尖彼此距离约 1 厘米，侧脉 8—10 对，和中脉在上面平坦，下面隆起，网脉干时上面稍下陷，下面隆起；小叶柄长 4—6 厘米，无毛。完整的花序未见；分枝近横生或斜生，长 3—7 厘米，疏生星状绒毛，顶端着生头状果序 1 个；头状果序紧密，球形，直径约 1.5—2 厘米，有果实多数；苞片早落；小苞片线状披针形，长 3—4 毫米，外面密生绒毛；花（根据果序上残留的）无梗或近无梗，长约 4 毫米；萼密生绒毛，有 5 个三角形小齿；花瓣 5，革质，三角形，长约 2 毫米，外面有绒毛；雄蕊 5，花丝甚短；子房 5 室；花柱 5，长约 1.2 毫米，离生。果实近球形，有 5 稜，直径约 5 毫米，长 4 毫米，几无毛；宿存花柱离生几至基部，反曲；花盘平坦，直径约 2 毫米；果梗长约 3 毫米。果期 2 月。

产云南。生于山谷密林中，海拔 2700 米。模式标本采自云南凤庆。

本种花密集成头状花序，花柱离生，叶缘有疏生锯齿，与国产本属其他有头状花序的种类容易区别。它和印度产的 *Schefflera cephalotes* (C. B. Clarke) Harms 相近，但那种植物的小叶片较大，全缘，果实长圆形，有 5—8 稜，无小苞片，花盘在结实后也较大。

37. 中华鹅掌柴 图版 7:10—17

Schefflera chinensis (Dunn) Li in Sargentia 2: 17. f. 1. 1942; 何景、曾沧江, 植物分类学报增刊 1: 141. 1965 —— *Oreopanax chinensis* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 500. 1903; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 186. 1924 —— *Schefflera wangii* Li, l.c. 2: 18. 1942, pro parte.

乔木，高 5—10 米。叶有小叶 6—7；叶柄长 10—30 厘米，无毛；小叶片革质，中

