

12 厘米,宽 2—4.5 厘米,先端长渐尖,基部阔楔形,两面均无毛,边缘全缘或有不明显细齿,基脉三出,侧脉 10—16 对,两面略明显,网脉不明显;叶柄长 0.5—5 厘米。花未见。伞形果序单个顶生,有果多数;总花梗粗短,长约 5 毫米。果实球形,直径 6 毫米,有稜,多少挤生;果梗长 3—5 毫米;宿存花柱 5,长约 1 毫米或稍长,中部以下合生,顶端离生,反曲。

产广东、广西。模式标本采自广西金秀。

本种与树参 *Dendropanax dentiger* (Harms) Merr. 极相似,但果梗较短,果实挤生。

6. 长萼树参

Dendropanax productus Li in Sargentia 2: 44. f. 7. 1942; 何景、曾沧江,植物分类学报增刊 1: 144. 1965.

灌木或小乔木,高 2—5 米。叶片纸质,有半透明红棕色腺点,椭圆形、长圆状椭圆形、卵状椭圆形,稀倒卵状长圆形,长 10—15 厘米,宽 3.5—5.5 厘米,先端长渐尖,基部楔形,两面均无毛,边缘在中部以上或近先端处疏生细齿,基脉三出,侧脉 6—10 对,两面略明显,网脉不隆起;叶柄长 1—7 厘米,无毛。伞形花序单个顶生,有花 10—15 朵;总花梗长 6—8 毫米或长至 2.5 厘米;花梗长 5 毫米;萼长 4 毫米,有不明显 5 小齿;花瓣 5,卵形,长约 2 毫米;雄蕊 5,花丝长约 1 毫米;子房 5 室;花柱长约 1 毫米,几合生。果实长圆状卵形,长 7 毫米,直径 3.5 毫米,有 5 稜,边缘有宿存冠状萼缘;宿存花柱长 1.7 毫米,4/5 合生,顶端离生,直立。

产广东(连南、始兴、新丰)。生于山谷疏林中,海拔 350—885 米。模式标本采自广东惠阳。

本种与树参 *Dendropanax dentiger* (Harms) Merr. 极近似,但叶片的网脉不隆起,果实长圆状卵形,顶端有一圈冠状萼缘。

7. 胀果树参 胀果木五加(广西植物名录)

Dendropanax inflatus Li in Sargentia 2: 45. 1942; 何景、曾沧江,植物分类学报增刊 1: 143. 1965.

乔木,高 4—10 米;小枝有不规则皱纹,一年生的棕紫色,无毛。叶片厚革质,无腺点,卵状椭圆形或椭圆形,长 5.5—13 厘米,宽 2.5—6 厘米,先端渐尖,基部阔楔形至近圆形,干时上面棕紫色或棕色,两面均无毛,边缘全缘,基脉三出,中脉上面平坦或稍隆起,下面隆起,侧脉 4—6 对,下面比上面明显,网脉上面不明显,下面略明显;叶柄长 1.5—8 厘米,无毛。伞形花序单个顶生,有花 10—30 朵;总花梗短,结实时可长至 5 厘米;花梗长 0.5—1 厘米,结实时长约 2 厘米;萼倒圆锥形,边缘全缘或有 5