

常春木属分种检索表

1. 叶片卵形至卵状三角形, 通常掌状 2—3 浅裂, 下面疏生星状绒毛; 花梗长 3—4 毫米 1. 常春木 *M. chinensis* Li
1. 叶片椭圆状长圆形至椭圆状披针形, 不分裂, 两面均无毛; 花梗长 6—13 毫米 2. 长梗常春木 *M. listeri* (King) Li

1. 常春木(中国高等植物图鉴) 图版 11:1—3

Merrillianpanax chinensis Li in *Sargentia* 2: 65. f. 11. 1942; A. R. K. Sastry in *Blumea* 15: 293. 1967; 中国高等植物图鉴 2: 1033. f. 3795. 1972.

常绿灌木; 小枝有短柔毛。叶片纸质, 卵形至三角状卵形, 长 6—11 厘米, 宽 4—9.5 厘米, 先端渐尖或尾状, 基部阔楔形至近圆形, 边缘全缘或 2—3 浅裂, 裂片卵状三角形, 中央裂片通常较大, 上面无毛, 下面疏生星状绒毛或几无毛, 基部有主脉 3 条, 侧脉 4—5 对, 两面隆起而明显, 网脉在中脉两侧平行排列, 明显; 叶柄细长, 长 5—13 厘米。圆锥花序顶生, 长约 12 厘米, 主轴及分枝疏生星状绒毛; 花不明; 伞形果序有果实 3—7 个; 果梗长 3—4 毫米。果实(未熟)椭圆球形, 直径 3—4 毫米; 花盘小, 不发达, 直径 1.5—2 毫米; 花柱 2, 离生, 先端反曲。

产云南西北部。生于海拔 1450 米处的森林中。模式标本采自云南贡山。

2. 长梗常春木 长果柄常春木(中国高等植物图鉴) 图版 11:4—6

Merrillianpanax listeri (King) Li in *Sargentia* 2: 63. f. 10. 1942; A. R. K. Sastry in *Blumea* 15: 293. 1967; 中国高等植物图鉴 2: 1033. 1972 — *Dendropanax listeri* King in *Journ. As. Soc. Bengal* 67 (2): 294. 1898 & in *Ann. Bot. Gard. Calcutta* 9: t. 55. 1901; Merr. in *Brittonia* 4: 133. 1941 — *Nothopanax membranifolius* W. W. Smith in *Notes Bot. Gard. Edinb.* 10: 53. 1917 & 17: 114, 159, 256, 278, 309, 314, 1929—30; Nakai in *Journ. Jap. Bot.* 15: 10. 1939 — *Gilibertia myriantha* Hand.-Mazz. in *Anz. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl.* 60: 184. 1923 — *Gilibertia listeri* Hand.-Mazz. in *Anz. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl.* 60: 185. 1923 — *Gilibertia membranifolia* Hand.-Mazz. *Symb. Sin.* 7: 621. 1933.

常绿灌木或小乔木, 高 2—7 米, 树皮淡灰色; 枝细长, 无毛或稍有棕色毛。叶片膜质或薄纸质, 椭圆状长圆形至椭圆状披针形, 长 8—20 厘米, 宽 3—8 厘米, 先端突然尾状渐尖, 尖头长至 3 厘米, 平直或略弯曲, 基部阔楔形至圆形, 上面深绿色, 下面淡绿色, 两面均无毛, 边缘全缘或有疏齿, 基部有主脉 3 条, 侧脉 3—6 对, 在中脉两侧等

距的平行排列,上面不及下面明显,网脉不明显;叶柄细长,无毛,长3—15厘米;托叶和叶柄基部合生。圆锥花序顶生,长8—15厘米,分枝细长,无毛或疏生星状绒毛;伞形花序直径1.5—2.5厘米,有花4—12朵;花梗长6—13毫米;花淡绿色;萼无毛或疏生星状绒毛,长1.5毫米,边缘有5小齿;花瓣5,三角状卵形,长1.5—2毫米,无毛;雄蕊5,花丝长约2毫米;子房2室;花柱2,离生或基部合生。果实椭圆球形至球形,长4—5毫米;花盘小,不发达。花期6月,果期10月。

产云南西北部(贡山一带)。生于森林或灌木林中,海拔1600—3300米。印度东北部也有分布。

本种与常春木 *Merrilliapanax chinensis* Li 的区别在于本种叶片较薄,不分裂,两面均无毛,叶缘有疏齿,花梗较长。《中国高等植物图鉴》将本种与常春木之区别误为本种叶片较厚,常2—3裂,下面有散生星状毡毛,边缘无齿,果柄较短。

13. 梁王茶属*——*Nothopanax* Miq.

Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 765. 1855; Seem. in Journ. Bot. 4: 293.

1866; Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 76. 1967.

常绿无刺乔木或灌木。叶为单叶或掌状复叶;叶柄细长;无托叶或在叶柄基部有小形附属物。花聚生为伞形花序,再组成顶生圆锥花序;苞片和小苞片早落;花梗有明显的关节;萼筒边缘全缘或有5小齿;花瓣5,在花芽中镊合状排列;雄蕊5;子房2室,稀3—4室;花柱2,稀3—4,离生或中部以下合生。果实球形,侧扁。种子侧扁;胚乳匀一。

本属的模式种: 梁王茶 *Nothopanax cochleatus* (Lam.) Miq. (*Aralia cochleata* Lam.) 产于马来半岛。

本属约有15种,主要分布于大洋洲,我国仅有2种。

本属特点在于花梗明显的有关节,子房2室,花柱离生或中部以下合生,果实侧扁。它和常春木属 *Merrilliapanax* Li 有密切的关系,区别在于后者花梗无关节,果实椭圆球形,叶均为单叶。

梁王茶属分种检索表

1. 叶为单叶,叶片不分裂或掌状分裂,稀掌状复叶,如为掌状复叶则其小叶3,小叶片通常较宽,宽

* 属的异名: 假蕨属(中国种子植物科属辞典)。

