

距的平行排列,上面不及下面明显,网脉不明显;叶柄细长,无毛,长3—15厘米;托叶和叶柄基部合生。圆锥花序顶生,长8—15厘米,分枝细长,无毛或疏生星状绒毛;伞形花序直径1.5—2.5厘米,有花4—12朵;花梗长6—13毫米;花淡绿色;萼无毛或疏生星状绒毛,长1.5毫米,边缘有5小齿;花瓣5,三角状卵形,长1.5—2毫米,无毛;雄蕊5,花丝长约2毫米;子房2室;花柱2,离生或基部合生。果实椭圆球形至球形,长4—5毫米;花盘小,不发达。花期6月,果期10月。

产云南西北部(贡山一带)。生于森林或灌木林中,海拔1600—3300米。印度东北部也有分布。

本种与常春木 *Merrilliopanax chinensis* Li 的区别在于本种叶片较薄,不分裂,两面均无毛,叶缘有疏齿,花梗较长。《中国高等植物图鉴》将本种与常春木之区别误为本种叶片较厚,常2—3裂,下面有散生星状毡毛,边缘无齿,果柄较短。

13. 梁王茶属*——*Nothopanax* Miq.

Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 765. 1855; Seem. in Journ. Bot. 4: 293.

1866; Hutch. Gen. Fl. Pl. 2: 76. 1967.

常绿无刺乔木或灌木。叶为单叶或掌状复叶;叶柄细长;无托叶或在叶柄基部有小形附属物。花聚生为伞形花序,再组成顶生圆锥花序;苞片和小苞片早落;花梗有明显的关节;萼筒边缘全缘或有5小齿;花瓣5,在花芽中镊合状排列;雄蕊5;子房2室,稀3—4室;花柱2,稀3—4,离生或中部以下合生。果实球形,侧扁。种子侧扁;胚乳匀一。

本属的模式种: 梁王茶 *Nothopanax cochleatus* (Lam.) Miq. (*Aralia cochleata* Lam.) 产于马来半岛。

本属约有15种,主要分布于大洋洲,我国仅有2种。

本属特点在于花梗明显的有关节,子房2室,花柱离生或中部以下合生,果实侧扁。它和常春木属 *Merrilliopanax* Li 有密切的关系,区别在于后者花梗无关节,果实椭圆球形,叶均为单叶。

梁王茶属分种检索表

1. 叶为单叶,叶片不分裂或掌状分裂,稀掌状复叶,如为掌状复叶则其小叶3,小叶片通常较宽,宽

* 属的异名: 假蕨属(中国种子植物科属辞典)。

度多在 2.5 厘米以上,无小叶柄或几无小叶柄.....

- 1. 异叶梁王茶 *N. davidii* (Franch.) Harms ex Diels
 1. 叶通常为掌状复叶,有小叶 2—5,稀为单叶;小叶片较狭,宽 1—2.5 厘米,明显的有小叶柄 ...
 2. 掌叶梁王茶 *N. delavayi* (Franch.) Harms ex Diels

1. 异叶梁王茶 梁王茶(中国种子植物分类学),大卫梁王茶(经济植物手册) 图版 11:7

Nothopanax davidii (Franch.) Harms ex Diels in Bot. Jahrb. **29**: 488. 1900; Harms & Rehd. in Sargent, Pl. Wils. **2**: 556. 1916; 钟心煊, 科学社丛刊 **1**: 187. 1924; Li in Sargentia **2**: 66. 1942; 中国高等植物图鉴 **2**: 1033. f. 3796. 1972 ——— *Panax davidii* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris **2**(8): 248 (Pl. David. **2**: 66. 1888) 1886 ——— *Acanthopanax diversifolium* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 340. 1888; Lévél., Cat. Pl. Yunnan **11**. 1915 ——— *Nothopanax diversifolius* Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. **3**(8): 48. 1894 ——— *Nothopanax bockii* Harms ex Diels in Bot. Jahrb. **29**: 488. 1900; 钟心煊, 同前刊 **1**: 187. 1924 ——— *Acanthopanax davidii* Vig. in Ann. Sci. Nat. 9. Bot. **4**: 41. 1906 ——— *Acanthopanax bockii* Vig. l.e. 9. Bot. **4**: 41. 1906 ——— *Nothopanax latifolius* Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl. **61**: 121. 1924 & Symb. Sin. **7**: 695. 1933.

灌木或乔木,高 2—12 米。叶为单叶,稀在同一枝上有 3 小叶的掌状复叶;叶柄长 5—20 厘米;叶片薄革质至厚革质,长圆状卵形至长圆状披针形,或三角形至卵状三角形,不分裂、掌状 2—3 浅裂或深裂,长 6—21 厘米,宽 2.5—7 厘米,先端长渐尖,基部阔楔形或圆形,有主脉 3 条,上面深绿色,有光泽,下面淡绿色,两面均无毛,边缘疏生细锯齿,有时为锐尖锯齿,侧脉 6—8 对,上面明显,下面不明显,网脉不明显;小叶片披针形,几无小叶柄。圆锥花序顶生,长达 20 厘米;伞形花序直径约 2 厘米,有花 10 余朵;总花梗长 1.5—2 厘米;花梗有关节,长 7—10 毫米;花白色或淡黄色,芳香;萼无毛,长约 1.5 毫米,边缘有 5 小齿;花瓣 5,三角状卵形,长约 1.5 毫米;雄蕊 5,花丝长约 1.5 毫米;子房 2 室,花盘稍隆起;花柱 2,合生至中部,上部离生,反曲。果实球形,侧扁,直径 5—6 毫米,黑色;宿存花柱长 1.5—2 毫米。花期 6—8 月,果期 9—11 月。

分布于陕西(太白山)、湖北(兴山、巴东、利川、建始)、湖南(石门)、四川(天全、宝兴、木里、大凉山、屏山、金佛山)、贵州(贵阳、梵净山)、云南(贡山、泸水、勐腊、屏边、镇雄)。生于疏林或阳性灌木林中、林缘,路边和岩石山上也有生长,海拔在湖北、四川