

和贵州通常分布于 800—1800 米,在云南则高达 2500—3000 米。

本种为民间草药,治跌打损伤、风湿关节痛。

李惠林在 *Sargentia* 2: 66. 1942 记载,认为湖北和四川的标本仅有单叶,决无复叶,这种断语是不确实的,这两省的标本具复叶的也很多。

2. 掌叶梁王茶 梁王茶(种子植物名称),台氏梁王茶(中国种子植物分类学) 图版 11:8—10

*Nothopanax delavayi* (Franch.) Harms ex Diels in Bot. Jahrb. 29: 488. 1900; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 695. 1933; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 115. 1934; Li in *Sargentia* 2: 67. 1942; Lauener in Notes Bot. Gard. Edinb. 32: 95. 1972 — *Panax delavayi* Franch. in Journ. de Bot. 10: 305. (Pl. Sin. Ecl. Prim. 75. 1897) 1896 — *Acanthopanax delavayi* Vig. in Ann. Sci. Nat. 9. Bot. 4: 42. 1906 — *Aralia bodinieri* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 24: 143. 1914 & Fl. Kouy-Tchéou 34. 1914.

灌木,高 1—5 米。叶为掌状复叶,稀单叶;叶柄长 4—12 厘米;小叶片 3—5,稀 2 或 7,长圆状披针形至椭圆状披针形,长 6—12 厘米,宽 1—2.5 厘米,先端渐尖至长渐尖,基部楔形,上面绿色,下面淡绿色,两面均无毛,边缘疏生钝齿或近全缘,侧脉 6—8 对,上面明显,下面不明显,网脉不明显;小叶柄长 1—10 毫米。圆锥花序顶生,长约 15 厘米;伞形花序直径约 2 厘米,有花 10 余朵;总花梗长 1—1.5 厘米;苞片卵形,膜质,长约 2 毫米,早落;小苞片长约 1 毫米,三角形,早落;花梗有关节,长 8—10 毫米;花白色;萼无毛,长约 1 毫米,边缘有 5 个三角形小齿;花瓣 5,三角状卵形,长约 1.5 毫米;雄蕊 5,花丝长 2.5—3 毫米;子房 2 室;花柱 2,基部合生,先端离生;花盘稍隆起。果实球形,侧扁,直径约 5 毫米;宿存花柱长 2.5—3 毫米。花期 9—10 月,果期 12 月至次年 1 月。

分布于贵州(安龙)、云南(蒙自、昆明、嵩明、大理、维西、丽江、德钦)。生于森林或灌木丛中,海拔 1600—2500 米。模式标本采自云南大理。

本种为民间草药,茎皮有清热消炎、生津止泻之效,主治喉炎。

图版 11: 1—3. 常春木 *Merrillioanax chinensis* Li, 1. 枝叶; 2. 伞形果序; 3. 果实。4—6. 长梗常春木 *Merrillioanax listeri* (King) Li, 4. 花枝; 5. 花; 6. 果实。7. 异叶梁王茶 *Nothopanax davidii* (Franch.) Harms, 7. 花枝。8—10. 掌叶梁王茶 *Nothopanax delavayi* (Franch.) Harms, 8. 花枝; 9. 花; 10. 果实。

