

2. 尖苞罗伞 尖苞柏那参(植物分类学报增刊), 尖苞掌叶树(广西植物名录)

Brassaiopsis spinibracteata Hoo, 植物分类学报增刊 1: 151. 1965 —— *Schefflera producta* auct. non (Dunn) Vig.: Li in Sargentia 2: 23. 1942, pro parte.

灌木或小乔木, 高 1.3—3 米, 树皮棕色; 小枝灰色, 疏生圆锥形短刺。叶有 7 小叶; 叶柄细长, 长 19—29 厘米, 无毛; 托叶和叶柄基部合生, 先端离生; 小叶片长圆形至椭圆形, 长 10—13.5 厘米, 宽 3.5—5 厘米, 先端渐尖至尾尖状, 基部圆形至阔楔形, 两面均无毛, 边缘中部以上有细锯齿, 侧脉约 8 对, 隆起而明显, 网脉在上面下陷, 两面均明显; 小叶柄长 0.5—3 厘米, 侧生者较短, 无毛。圆锥花序顶生, 基部有多数鳞片; 鳞片阔卵形, 长约 1 厘米, 密生白色绒毛, 先端 3 裂, 刺状; 分枝长 1.8—2.5 厘米, 幼时有白色绒毛, 后毛渐脱落, 顶端有 1 个伞形花序, 其下有时另有 1—2 个小伞形花序; 总花梗长 0.9—1.5 厘米; 苞片阔卵形, 长 5—7 毫米, 密生白色绒毛, 在圆锥花序下部的先端 3 裂, 刺状, 上部的先端长刺状; 花梗长 2—5 毫米, 密生白色绒毛; 小苞片长圆状卵形, 长约 2 毫米, 外面密生白色绒毛; 萼密生白色绒毛, 长约 2 毫米, 边缘有 5 个三角形尖齿; 花瓣 5, 长 3—4 毫米; 雄蕊 5, 花丝长 2.5 毫米; 子房 3 室; 花柱合生成柱状, 长约 0.8 毫米。幼果近球形, 直径 4—5 毫米, 宿存花柱长 1.2 毫米, 果梗长 8—10 毫米。花期 9—11 月。

产广西(隆林)和贵州(册亨、郎岱)。生于石灰岩山地, 海拔 1100—1500 米。模式标本采自广西隆林。

本种小枝有明显的刺, 子房 3 室, 不是鹅掌柴属 *Schefflera* J. R. & G. Forst.。它与尖叶罗伞 *Brassaiopsis acuminata* Li 和栎叶罗伞 *Brassaiopsis quercifolia* Hoo 相近, 但后两种植物圆锥花序的主轴和分枝密生锈色绒毛, 苞片先端无长刺尖, 子房 2 室等点和本种不同。

3. 广西罗伞 广西柏那参(植物分类学报增刊), 广西掌叶树(广西植物名录)

Brassaiopsis kwangsiensis Hoo, 植物分类学报增刊 1: 150. 1965.

小乔木, 高约 3 米; 小枝粗壮, 淡黄棕色, 无毛, 有明显的 V 形叶痕和散生的皮孔。叶有小叶 6—8; 叶柄长 8—32 厘米, 无毛; 小叶片纸质, 披针形, 中央的长 12—20 厘米, 宽 3—6 厘米, 两侧的较小, 菱状披针形, 外侧宽, 先端长渐尖, 基部圆形或阔楔形, 上面深绿色, 下面灰白色, 两面均无毛, 边缘在先端有数个疏离锯齿, 侧脉 10—15 对, 两面均明显, 网脉不明显; 小叶柄长 1.5—6.5 厘米, 中央的较长, 两侧依次渐短, 无毛。圆锥花序顶生, 长约 7 厘米, 宽约 10 厘米; 分枝有白色星状绒毛, 有 4—5 个总状排列的伞形花序; 伞形花序直径 1.5—2 厘米, 有花约 30 朵; 总花梗长 1—2 厘米, 密生白