

色星状绒毛;苞片和小苞片长圆状卵形,密生白色星状绒毛,前者长2毫米,后者长1毫米;花梗长3—4毫米,密生白色星状绒毛;萼长2.5毫米,密生白色星状绒毛,边缘有5个三角形钝齿;花瓣5,披针形,上半部淡绿色,下半部紫红色(据采集记录),长约3毫米;子房4室或3室,花柱合生成柱状。果实(未熟)长圆状球形,长约3.5毫米,无稜,宿存花柱长2毫米。花期12月。

产广西(凌云)和贵州(印江)。生于疏林或干燥山谷中,海拔400—1300米。模式标本采自广西凌云。

本种和细梗罗伞 *Brassaiopsis gracilis* Hand.-Mazz. 相近,但后者小叶片膜质,上面疏生短刺毛,下面绿色,基部狭尖,边缘有锯齿,无小叶柄或只有短柄,花序主轴被锈色绒毛,子房2室等点不同。又和尖叶罗伞 *Brassaiopsis acuminata* Li 相近,但后者小叶片下面、小叶柄、叶柄和花序主轴都被锈色绒毛,小叶片下面非灰白色,花梗长达1.5厘米,子房2室,果实扁球形等点不同。

4. 镇康罗伞

Brassaiopsis chengkangensis Hu, 静生汇报 10: 162. 1940; Li in *Sargentia* 2: 56. 1942.

乔木,高达15米,胸高直径20厘米,树皮灰淡绿色。叶有小叶5—7,稀3;叶柄粗壮,长30—60厘米,幼时密生锈色粗刺毛,后毛渐脱落;小叶片革质,卵状长圆形至长圆状披针形,长15—30厘米,有时长达50厘米,宽6—13厘米,有时宽达28厘米,先端渐尖至长渐尖,基部阔楔形至圆形,两面幼时密生锈色星状绒毛和粗刺毛,后毛渐脱落,上面几无毛,下面毛稀疏,边缘疏生有小尖头的齿,侧脉18对,两面均明显,网脉明显;小叶柄长1.5—4.5厘米,有时长至10—15厘米,粗壮,密生锈色粗刺毛。圆锥花序大,长35厘米,有时长达90厘米,下垂;主轴粗壮,密生锈色粗刺毛;伞形花序直径3.5—5厘米,有花多数;总花梗长2.5—5厘米,花梗长8毫米,均密生粗刺毛;苞片三角状卵形,先端尖,长约1.5厘米,和舌状的小苞片均密生锈色粗刺毛;萼长2.5毫米,密生粗刺毛,边缘有5个线状披针形的齿;花瓣5,卵形,长3毫米,外面密生锈色粗刺毛;雄蕊5,长2毫米;子房2室,稀3—4室,花盘厚;花柱合生成柱状,长约1.2毫米。8月现蕾,次年4月开花。

产云南(镇康、凤庆、潞西)。生于林中,海拔1700—2400米。模式标本采自云南镇康。

本种主要特点为小叶片很大,两面幼时密生粗刺毛及星状绒毛。

5. 瑞丽罗伞

Brassaiopsis shweliensis W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. 10: 13. 1917; Li in Sargentia 2: 58. 1942.

灌木,高达 7.5 米;枝粗壮,有刺。叶有小叶 6—7;叶柄长至 40 厘米,有锈色绒毛,不久毛脱净;小叶片革质,长圆形,长 24 厘米,宽 9 厘米,先端长渐尖,基部狭楔形,幼时有锈色星状绒毛,不久毛脱净,边缘在上部有硬锯齿,侧脉 12—15 对,上面不明显,下面明显,网脉不甚明显;小叶柄短,长仅 1 厘米,被毛和叶柄一样。圆锥花序大,长至 30 厘米;主轴粗壮,有锈色绒毛或几无毛;伞形花序有花多数,直径约 2.5 厘米;苞片舟形,革质,宿存,长约 1.5 厘米;花梗长约 1 厘米,有锈色绒毛;花未见。果实球形,2 室,直径约 7 毫米;萼边缘有尖齿,初有绒毛,不久毛脱落;花盘半球形,宿存花柱长 2 毫米。

产云南西部。生于灌丛中,海拔 1800 米。模式标本采自云南瑞丽。未见到标本,根据原记载描述。

6. 罗伞 鸭脚罗伞(中国高等植物图鉴),柏那参(中国树木分类学),掌叶树(种子植物名称、广西植物名录),华丽柏那参(中国种子植物分类学) 图版 16:4—8

Brassaiopsis glomerulata (Bl.) Regel in Gartenflora 12: 275. t. 411. 1863; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 140. 1927; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 694. 1933; 陈焕镛,中山大学农林植物所专刊 4: 248. 1940; Li in Sargentia 2: 58. 1942; N. S. Bui in Adansonia 6: 437. 1966; 中国高等植物图鉴 2: 1031. f. 3792. 1972; Lauener in Notes Bot. Gard. Edinb. 32: 94. 1972 — *Aralia glomerulata* Bl. Bijdr. 2: 872. 1826 — *Hedera floribunda* Wall. List. no. 4912 A. 1832, nom. nud.; G. Don, Gen. Syst. 3: 394. 1834; Walp. Rep. 2: 432. 1843 — *Brassaiopsis speciosa* Decne. & Planch. in Rev. Hort. 4 (3): 106. 1854; Seem. in Journ. Bot. 2: 292 (Revis. Heder. 19. 1868) 1864; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 737. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 425. 1911; 陈嵘,中国树木分类学 928. 1937 — *Macropanax glomerulatum* Miq. in Fl. Ind. Bat. 1 (1): 764. 1855 — *Brassaiopsis floribunda* Seem. l. c. 2: 292. 1864 — *Acanthopanax esquirolii* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 24: 143. 1914 & Fl. Kouy-Tchéou 33. 1914, pro parte; Li. l. c. 2: 90. 1942 — *Schefflera thorelii* Vig. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 1177. 1923.

罗伞(原变种)

Brassaiopsis glomerulata (Bl.) Regel var. **glomerulata**.