

叶柄长 6—15 厘米,细弱,无毛或略有毛,先端丛生细刺;小叶片膜质,卵形至椭圆状披针形,长 8—20 厘米,宽 3—8 厘米,先端长渐尖,基部狭尖,两侧的歪斜,上面疏生刺毛,下面无毛或有稀疏短柔毛,边缘有锯齿,侧脉 6—8 对,两面均明显,网脉在上面不明显,下面明显;小叶柄长 0—15 毫米,略有毛。圆锥花序腋生,稀疏,只有几个伞形花序,长 7—8 厘米;伞形花序直径 1.5—3 厘米,有花多数;总花梗长 2—8 厘米,花梗长 1 厘米,均密生锈色绒毛;苞片三角形,长 6—7 毫米,密生锈色绒毛;花绿色;萼长 2 毫米,无毛,边缘有 5 个不明显的齿;花瓣 5,三角形,长 2.8 毫米;雄蕊 5,花丝长 1.5 毫米;子房 2 室;花柱合生成柱状,长 1.2 毫米。果实(未熟)球形,直径 4 毫米。花期 8 月,果期 12 月。

分布于广西(凌云)、贵州(兴仁)和云南(砚山)。生于森林中,海拔 1100—1600 米。模式标本采自广西凌云。越南也有分布。

9. 尖叶罗伞 披针叶柏那参(植物分类学报增刊)

Brassaiopsis acuminata Li in *Sargentia* 2: 57. f. 9. 1942.

灌木,高 2—3 米。叶有小叶 6—9;叶柄细长,长至 30 厘米,略有锈色绒毛;小叶片纸质,卵状披针形,长 9—18 厘米,宽 2.5—4.5 厘米,先端长渐尖,尖头长 1.5—2 厘米,基部渐狭成楔形,上面无毛,下面疏生锈色绒毛,边缘近全缘或上部疏生细锯齿,侧脉约 8 对,两面均明显,网脉也明显;小叶柄长 1—4.5 厘米,略有锈色绒毛。圆锥花序稀疏,只有几个伞形花序;伞形花序直径 4—5 厘米,有花 6—11 朵;总花梗长 2—5 厘米,花梗长 1.5 厘米,均略有锈色绒毛;萼筒宽,有锈色绒毛,边缘有 5 个不明显的齿;花瓣 5,白色,卵形,长约 4 毫米,外面疏生锈色绒毛至几无毛;雄蕊 5,花丝长 3 毫米;子房 2 室;花盘隆起,半球形;花柱合生成柱状,长约 1.5 毫米。果实阔扁球形,长约 8 毫米,花盘约为果实长的 1/3,宿存花柱长约 3 毫米,果梗长约 3 厘米。花期 9—10 月。

产云南西北部。生于密林中,海拔约 1500 米。模式标本采自云南贡山。

本种圆锥花序稀疏、花梗细长等特征与长梗罗伞(变种) *Brassaiopsis glomerulata* (Bl.) Regel var. *longipedicellata* Li 近似,但本种小叶片狭长,先端长渐尖,基部非圆形,伞形花序少数花,宿存花柱长 3 毫米,可以区别。

10. 显脉罗伞 显脉柏氏参(植物分类学报),显脉掌叶树(广西植物名录)

Brassaiopsis phanerophlebia (Merr. & Chun) C. N. Ho, 植物分类学报 2: 72. 1952 — *Acanthopanax phanerophlebius* Merr. & Chun, 中山大学农林植物所专刊 2: 12. t. 6. 1934; Li in *Sargentia* 2: 76. 1942.