

直立或蔓生灌木,高约2米;一年生枝有栗色短柔毛。叶有小叶3—4;叶柄长10—16厘米,无毛,散生细刺;小叶片纸质,长圆状椭圆形,长14—17厘米,宽5.5—8厘米,先端渐尖,基部狭尖,侧生小叶片基部歪斜,外侧宽,两面均无毛,边缘有锯齿,侧脉约10对,两面均隆起而明显,网脉也隆起而明显;小叶柄长2—10毫米。圆锥花序顶生,短而稀疏,长4—9厘米,只有几个伞形花序;主轴和分枝有棕色短柔毛,疏生或密生细刺;伞形花序直径约2.5厘米,有花多数;总花梗长1—4.5厘米,花梗长1—1.5厘米,均密生栗色长毛;苞片卵形,先端渐尖,长5—7毫米,密生栗色长毛;小苞片披针形,长约3毫米;花白色;萼有锈色短柔毛,长约2毫米,边缘有5个三角形的齿;花瓣5,长圆状卵形,先端尖,长2.5—3毫米,初有锈色短柔毛,后毛脱净或仅先端有残留的毛;雄蕊5;子房2室,稀3—4室;花盘隆起,半球形;花柱合生成柱状,长1—1.2毫米。花期10月。

分布于广东(信宜)、广西(金秀)、贵州(册亨)。生于山谷溪边森林内,海拔800—1000米。模式标本采自广东信宜。

本种与三叶罗伞 *Brassaiopsis tripteris* (Lévl.) Rehd. 十分相似,但小叶片长圆状椭圆形,边缘有锯齿,网脉隆起而显著,花柱较短等点可以区别。

### 11. 三叶罗伞

*Brassaiopsis tripteris* (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 115. 1934; Li in Sargentis 2: 56. 1942; Lauener in Notes Bot. Gard. Edinb. 32: 95. 1972 — *Heptapleurum tripteris* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 34: 145. 1914 & Fl. Kouy-Tchéou 35. 1914 & Ill. Pl. Seu-Tchéouen t. 1. 1918.

有刺矮灌木,高至1米。叶有3小叶,稀4;叶柄长11厘米,无毛;托叶与叶柄基部合生,先端离生部分渐尖头;小叶片纸质,倒卵状长圆形,长约13厘米,宽约5厘米,先端尖至渐尖,基部渐狭而长尖,两面均无毛,边缘有刺状细锯齿,侧脉约6对,上面不甚明显,下面明显,网脉不明显;小叶柄短或几无小叶柄。圆锥花序顶生,稀疏,只有几个伞形花序,主轴和分枝有刚毛及锈色绒毛或几无毛;伞形花序直径约2.5厘米,有花多数;总花梗长4.5厘米;苞片卵形,先端渐尖,长5—7毫米;小苞片线形,长约3毫米;花梗细长,长1—1.5厘米;萼有锈色绒毛,长约2毫米,边缘有5个三角形小齿;花瓣5,卵形,长约3毫米,无毛;子房2室,花盘隆起;花柱合生成柱状,长约2毫米。

产贵州南部和云南东南部。模式标本采自贵州罗甸。