

常绿灌木,高2—3米,树皮灰色,新枝密生锈色绒毛。叶三至五回羽状复叶,长50—60厘米;叶柄长15—30厘米;托叶小,不明显;小叶片在羽片轴上对生,椭圆状披针形,长2.5—5.5厘米,宽0.8—2厘米,先端长渐尖,基部狭楔形,上面深绿色,下面略灰白,两面均无毛,边缘反卷,全缘,侧脉约6对,上面不明显,下面稍明显;小叶柄长至1厘米或无柄。圆锥花序顶生,长约30厘米,主轴及分枝密生锈色绒毛;伞形花序直径约2厘米,有花多数;总花梗长1—1.5厘米,花梗长约4毫米,均密生锈色绒毛;苞片卵形,先端尖,长4—5毫米;小苞片线形,长约3毫米;花黄色,芳香;萼长约2毫米,密生锈色绒毛,边缘有5个三角形小齿;花瓣卵形,先端尖,长约2毫米,外面疏生绒毛;雄蕊5,花丝长约3毫米;子房2室;花柱2,离生,开展。果实侧扁,黑色,长约8毫米,厚约2毫米,宿存花柱长2—3毫米,果梗长1厘米。花期10—11月,果期次年1—2月。

分布于云南(思茅)、广西(南宁、上思)。生于海拔数百米的森林和灌丛中。模式标本采自云南思茅。

本种为民间草药,根和树皮治疗疮及跌打。

3. 短梗幌伞枫 短梗罗汉伞(福建师范学院学报)

Heteropanax brevipedicellatus Li in *Sargentia* 2: 94. 1942; 林来官, 福建师院学报第一期下卷 156. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 1039. 1972.

常绿灌木或小乔木,高3—7米,胸径15—20厘米;树皮灰棕色,有细密纵裂纹,新枝密生暗锈色绒毛。叶大,四至五回羽状复叶,长90厘米,宽60厘米;叶柄粗壮,长15—40厘米,有暗锈色绒毛,后毛渐脱落;叶轴密生暗锈色绒毛;小叶片纸质,椭圆形至狭椭圆形,长2—8.5厘米,宽0.8—3.5厘米,先端渐尖,基部阔楔形,上面深绿色,下面灰绿色,两面均无毛,边缘稍反卷,全缘,稀在中部以上疏生不规则细锯齿,侧脉5—6对,上面不明显,下面稍明显;小叶柄极短,或长至1厘米,密生暗锈色绒毛。圆锥花序顶生,长达70厘米,主轴和分枝密生暗锈色星状厚绒毛;伞形花序头状,直径1—1.5厘米,有花多数;总花梗长1—2厘米;苞片卵形,长5—12毫米,小苞片线形,长1.5—2毫米,外面均密生绒毛;花梗长1.5—2.5毫米,密生绒毛;花淡黄白色;萼长1.5—2毫米,密生星状绒毛,边缘有5个三角形小齿;花瓣5,三角状卵形,外面疏生星状绒毛,长约2毫米;雄蕊5,花丝长2毫米;子房2室,花盘稍隆起;花柱2,离生。果实扁球形,黑色,长5—6毫米,宽7—8毫米,厚约1毫米,宿存花柱长2—3毫米;果梗长4毫米,有毛。花期11—12月,果期次年1—2月。

分布于广西(阳朔、平南、凌云、大明山)、广东(乐昌、怀集、翁源)、江西(龙南、寻

乌)和福建(建瓯、沙县、南平、连城、龙岩)。生于低丘陵森林中和林缘路旁的荫蔽处。模式标本采自广东新丰。

根和树皮为民间草药,治跌打损伤、烫火伤及疮毒。

4. 亮叶幌伞枫

Heteropanax nitentifolius Hoo, 植物分类学报增刊 1:166. 1965.

常绿乔木,高4—7米。叶大,长达1米,二回羽状复叶,有羽片3—4对;叶柄长约10厘米,无毛,托叶和叶柄基部合生;小叶片厚革质,长圆形至椭圆形,长8—12.5厘米,宽3.5—5.8厘米,先端短渐尖,基部阔楔形,下延,上面有光泽,两面均无毛,边缘全缘,侧脉约8对,上面下陷,不甚明显,下面隆起,明显;小叶柄长0.3—1.8厘米,顶生的长至2.2厘米。圆锥花序顶生,长80—160厘米,主轴和分枝密生锈色绒毛;分枝多,长2—14厘米;伞形花序单生于分枝顶端,或数个组成顶生复伞形花序,有花多数或少数;总花梗长1.5—2厘米,花梗长5—8毫米,均密生锈毛;苞片和小苞片卵形,均密生锈毛;花绿色;萼密生锈毛,长约2毫米;萼齿5,三角形,长约0.6毫米;花瓣5,长圆状三角形,长2毫米;雄蕊5,花丝长约2毫米;子房2室;花柱2,离生,反曲。果实极扁,直径4—5毫米,厚1毫米,宿存花柱长3—4毫米,果梗长1厘米。花期11月,果期11月。

产云南南部。生于林缘路旁。模式标本采自云南河口。

5. 云南幌伞枫

Heteropanax yunnanensis Hoo, 植物分类学报增刊 1:167. 1965.

常绿乔木,高达10米。叶为二回羽状复叶,有羽片2—4对,在小枝上部的长20—50厘米;叶柄长6—22厘米,无毛;托叶小,和叶柄基部合生,先端离生部分三角形,长约2毫米,有锈毛;羽片有小叶3—7;小叶片纸质至薄革质,圆形至卵形,先端突尖至突长尖,基部圆形至阔楔形,下延,长4.5—5.5厘米,宽3.5—4.2厘米,两面均无毛,边缘全缘,侧脉4—5对,两面不甚明显,网脉不明显;小叶柄长2—12毫米,顶生的长至2.2厘米。圆锥花序大;分枝长达25厘米,有锈毛,后毛脱落,总状着生15—20个或更多的伞形花序;花未见。伞形果序约有果实10个;总花梗长1.8—2.4厘米,有锈毛;小苞片阔卵形,长约1毫米,先端尖。果实扁球形,直径6—7毫米,厚约1.5毫米;宿存花柱2,离生,反曲;果梗长2—3毫米。果期5月。

产云南(澜沧、景谷)。生于山谷杂木林中,海拔1500米。模式标本采自云南澜沧。