

状卵形,长约 1.5 毫米;雄蕊 5;子房 5 室,花柱合生成柱状。果实球形,黑色,直径约 5 毫米,5 棱,宿存花柱长约 2 毫米。 果期 10 月。

产四川。生于森林中,海拔 1600 米。模式标本采自四川天全。

本种和锈毛五叶参 *Pentapanax henryi* Harms 相近,区别在于后者小叶片较小,下面除脉腋有簇毛外余无毛,边缘密生锯齿,侧脉较少。

5. 五叶参 羽叶五加(种子植物名称),岩五加(云南土名) 图版 18:9—11

Pentapanax leschenaultii (Wight & Arn.) Seem. in Journ. Bot. **2**: 296 (Revis. Heder. 22. 1868) 1864; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 724. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 474. 1911; Diels in Notes Bot. Gard. Edinb. **7**: 116, 117. 1912; Lév. Cat. Pl. Yunnan 11. 1915; 钟心煊, 科学社丛刊 **1**: 189. 1924; W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. **14**: 270, 309, 352. 1924 & **17**: 101, 125, 165, 280, 340. 1929—30; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 700. 1933; Li in Sargentia **2**: 98. 1942; 中国高等植物图鉴 **2**: 1040. f. 3810. 1972——*Hedera leschenaultii* Wight & Arn. Prodr. **1**: 377. 1834——*Hedera trifoliata* Wight & Arn. l. c. **1**: 377. 1834; Wight, Icon. Pl. Ind. Orien. **1**: 16. t. 307. 1840.

五叶参(原变种)

Pentapanax leschenaultii (Wight & Arn.) Seem. var. ***leschenaultii***

常绿乔木或蔓生状灌木,高 5—15 米;树皮灰色,有裂纹。叶有小叶 3—5,稀 7;叶柄长 10—15 厘米,无毛或有稀疏短柔毛,有时在顶端更密;小叶片纸质至薄革质,椭圆状卵形,长 6—12 厘米,宽 2.5—6 厘米,先端渐尖,基部圆形,无毛或下面沿脉有短柔毛,边缘有刺状锯齿,侧脉 6—10 对,和网脉在上面不甚明显,在下面隆起而明显;小叶柄长 3—10 毫米,无毛。伞房状圆锥花序顶生,长 8—15 厘米;主轴短,长 1—2 厘米;分枝 8—12,在主轴上伞房状排列,有短柔毛;伞形花序直径 2—2.5 厘米,有花多数;总花梗长 1—3 厘米,无毛或略有短柔毛;花梗长 5—10 毫米,无毛或略有短柔毛;花白色;萼无毛,长约 2 毫米,边缘有 5 小齿;花瓣 5,长约 2 毫米,通常合生成帽状体,早落;子房 5 室,花柱合生成柱状。果实卵球形,长约 4 毫米,5 棱,宿存花柱长 1.5—2 毫米。 花期 7—8 月,果期 9—10 月。

分布于西藏(亚东、聂拉木、卡马河下游)、四川(木里)和云南(德钦、维西、大理)。生于森林中,海拔 2000—3600 米。锡金至缅甸也有分布。

本种为民间草药,茎、根皮治风湿关节痛。

全缘五叶参(变种)