

Pentapanax parasiticus* (D. Don) Seem. var. *parasiticus

蔓生常绿灌木,高1—2米。叶有小叶3—5;叶柄长3—6厘米,无毛;小叶片膜质,卵形至卵状披针形,长4—7厘米,宽2—3厘米,先端尖至渐尖,基部圆形至楔形,两面均无毛,边缘全缘,侧脉6—8对,两面均明显,网脉两面均明显;小叶柄长3—5毫米,无毛。圆锥花序顶生,长在10厘米以下,无毛,仅有总状排列的伞形花序2—8个;伞形花序直径2—3厘米,有花多数;总花梗长1—4厘米,无毛;苞片卵形,膜质,长3—5毫米;花梗细长,长0.8—1.5厘米,无毛;花红色;萼无毛,边缘有5小齿;花瓣5,三角状卵形,长约2毫米;雄蕊5,花丝长约2.5毫米;子房5室,花柱合生成柱状。果实卵球形,黑色,有5稜,长4—5毫米,宿存花柱长1.5—2毫米。花期9—10月,果期11—12月。

分布于四川(峨眉山、峨边)和云南(德钦、贡山)。生于灌木丛林中,海拔2500米。尼泊尔、印度也有分布。

本种外形和西南槲木 *Aralia wilsonii* Harms 很相似,区别在于后者为二回羽状复叶,小叶片边缘有不整齐的细锯齿或重锯齿,花柱离生。

毛梗寄生五叶参(变种)

***Pentapanax parasiticus* (D. Don) Seem. var. *khasianus* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 724. 1879.**

本变种和原变种的区别在于圆锥花序主轴和花梗有短柔毛。

分布于云南(嵩明)。生于森林中,海拔2100—2400米。孟加拉也有分布。

8. 云南五叶参

***Pentapanax yunnanensis* Franch. in Journ. de Bot. 10: 305. (Pl. Sin. Ecl. Prim. 25. 1897) 1896; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 11. 1915; 钟心煊,科学社丛刊 1: 189. 1924; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 700. 1933; Li in Sargentia 2: 100. 1942.**

常绿灌木。叶有5小叶;叶柄长4—12厘米,无毛;小叶片纸质,阔卵形,长5—7.5厘米,宽3.5—5.5厘米,先端钝或尖,基部圆形,两面均无毛,边缘有锯齿,侧脉约6对,和网脉在两面均明显;小叶片无柄,或有长达5毫米的柄,顶生小叶柄长至4厘米。圆锥花序顶生,长15—20厘米,无毛,约有10个伞形花序;伞形花序有花多数;总花梗长约2厘米;花梗长8—10毫米;萼无毛,边缘有5个圆形小齿;花瓣5;雄蕊5;子房5室,花柱合生成柱状。果实扁球形,直径约4毫米,有5稜。

产云南(宾川、大理)。模式标本采自云南洱源东北马耳山。