

9. 轮伞五叶参

Pentapanax verticillatus Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **35**: 498. 1903; 钟心煊, 科学社丛刊 **1**: 189. 1924; Li in Sargentia **2**: 100. 1942.

常绿灌木, 高 1—2 米。叶有 3 小叶; 叶柄长 3—5 厘米, 无毛; 小叶片薄革质, 卵形, 长 5—8 厘米, 宽 2—3 厘米, 先端尖, 基部圆形至楔形, 上面无毛, 下面有白粉, 边缘全缘, 反卷, 侧脉 6—8 对, 两面均明显, 网脉不甚明显; 小叶柄短。圆锥花序顶生, 长 6—10 厘米; 主轴有红锈色绒毛, 不分枝或仅基部有分枝; 分枝短, 长约 1.5 厘米; 花紫红色, 在主轴上轮生成无总梗的伞形花序, 在分枝上组成顶生伞形花序; 伞形花序直径 1.5—2 厘米, 有花多数; 花梗细长, 长 6—8 毫米; 萼无毛, 边缘有 5 小齿; 花瓣 5, 三角状卵形, 长 1.5 毫米; 雄蕊 5, 花丝长 3 毫米; 子房 5 室, 花柱合生成柱状。果实球形, 紫红色, 直径约 5 毫米, 果梗密生红色短毛。花期 10 月, 果期 12 月至次年 2 月。

分布于云南(屏边、麻栗坡)。生于密林、灌木丛林或山谷中, 海拔 1200—2000 米。模式标本采自云南蒙自。

21. 楤木属*——*Aralia* Linn.

Linn. Sp. Pl. **1**: 273. 1753.

小乔木、灌木或多年生草本, 通常有刺, 稀无刺。叶大, 一至数回羽状复叶; 托叶和叶柄基部合生, 先端离生, 稀不明显或无托叶。花杂性, 聚生为伞形花序, 稀为头状花序, 再组成圆锥花序; 苞片和小苞片宿存或早落; 花梗有关节; 萼筒边缘有 5 小齿; 花瓣 5, 在花芽中覆瓦状排列; 雄蕊 5, 花丝细长; 子房 5 室, 稀 4—2 室; 花柱 5, 稀 4—2, 离生或基部合生; 花盘小, 边缘略隆起。果实球形, 有 5 稜, 稀 4—2 稜。种子白色, 侧扁, 胚乳匀一。

本属的模式种: 刺楤木 *Aralia spinosa* Linn., 产于北美洲。

本属约有 30 多种, 大多数分布于亚洲, 少数分布于北美洲。我国有 30 种。

本属为小乔木、灌木或多年生草本, 通常为二至三回羽状复叶, 花 5 数, 花柱离生或基部合生, 和五叶参属 *Pentapanax* Seem. 的关系密切, 并较其进化程度高, 但花柱的合生程度则不及五叶参属。

* 属的异名: 土当归属(植物学大辞典)。