

本组我国产 12 种。

1. 长刺楸木(中国高等植物图鉴) 刺叶楸木(福建师范学院学报)

*Aralia spinifolia* Merr. in Philip. J. urn. Sci. 15: 294. 1919; Li in Sargentia 2: 105. 1942; 林来官, 福建师院学报第一期下卷 161. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 1041. f. 3811. 1972.

灌木, 高 2—3 米; 小枝灰白色, 疏生多数或长或短的刺, 并密生刺毛; 刺扁, 长 1—10 毫米, 基部膨大; 刺毛细针状, 长 2—4 毫米。叶大, 长 40—70 厘米, 二回羽状复叶, 叶柄、叶轴和羽片轴密生或疏生刺和刺毛; 托叶和叶柄基部合生, 先端离生部分锥形, 长约 5 毫米, 有纤毛; 羽片长 20—30 厘米, 有小叶 5—9, 基部有小叶 1 对; 小叶片薄纸质或近膜质, 长圆状卵形或卵状椭圆形, 长 7—11 厘米, 宽 3—6 厘米, 先端渐尖或长渐尖, 基部圆形, 有时略歪斜, 上面脉上疏生小刺和刺毛, 下面更密, 边缘有锯齿、不整齐锯齿或重锯齿, 齿有小尖头, 侧脉 5—7 对, 两面明显, 网脉上面不明显, 下面明显; 两侧的小叶几无柄, 顶生者有长 1—3 厘米的柄。圆锥花序大, 长达 35 厘米, 花序轴和总花梗均密生刺和刺毛; 伞形花序直径约 2.5 厘米, 有花多数; 花梗长 8—15 毫米, 密生刺毛; 苞片长圆形, 长 3—6 毫米, 无毛; 萼无毛, 长 1.5 毫米, 边缘有 5 个三角形尖齿; 花瓣 5, 淡绿白色, 卵状三角形, 长约 1.5 毫米; 子房 5 室; 花柱 5, 离生。果实卵球形, 黑褐色, 有 5 棱, 长 4—5 毫米; 宿存花柱长约 2 毫米, 合生至中部。 花期 8—10 月, 果期 10—12 月。

分布于广西(元宝山、金秀、梧州)、湖南(黔阳、通道)、江西(瑞金、兴国、寻乌)、福建(武夷山、龙岩、永春、德化、沙县、南平、永安)和广东(乳源、英德、鼎湖山、茂名)。生于山坡或林缘阳光充足处, 海拔约 1000 米以下。模式标本采自广东。

2. 虎刺楸木(中国高等植物图鉴) 广东楸木(中国树木分类学)

*Aralia armata* (Wall.) Seem. in Journ. Bot. 6: 134 (Revis. Heder. 91. 1868) 1868; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 723. 1879; Harms in Bot. Jahrb. 23: 18. 1896; Vig. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 1162. pl. 137 1—4. 1923; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 283. 1931; 陈嵘, 中国树木分类学 930. 1937; 胡先骕等, 静生汇报 8: 532. 1938; Li in Sargentia 2: 106. 1942; 中国高等植物图鉴 2: 1041. f. 3812. 1972 —— *Panax armatum* Wall. List. no. 4933. 1832, nom. nud.

多刺灌木, 高达 4 米; 刺短, 长在 4 毫米以下, 基部宽扁, 先端通常弯曲。叶为三回羽状复叶, 长 60—100 厘米; 叶柄长 25—50 厘米; 托叶和叶柄基部合生, 先端截形