

或斜形;叶轴和羽片轴疏生细刺;羽片有小叶 5—9,基部有小叶 1 对;小叶片纸质,长圆状卵形,长 4—11 厘米,宽 2—5 厘米,先端渐尖,基部圆形或心形,歪斜,两面脉上疏生小刺,下面密生短柔毛,后毛脱落,边缘有锯齿、细锯齿或不整齐锯齿,侧脉约 6 对,两面明显,网脉不明显。圆锥花序大,长达 50 厘米,主轴和分枝有短柔毛或无毛,疏生钩曲短刺;伞形花序直径 2—4 厘米,有花多数;总花梗长 1—5 厘米,有刺和短柔毛;花梗长 1—1.5 厘米,有细刺和粗毛;苞片卵状披针形,先端长尖,长 2—4 毫米,小苞片线形,长 1.2—2.5 毫米,外面均密生长毛;萼无毛,长约 2 毫米,边缘有 5 个三角形小齿;花瓣 5,卵状三角形,长约 2 毫米;雄蕊 5;子房 5 室;花柱 5,离生。果实球形,直径 4 毫米,有 5 稜。花期 8—10 月,果期 9—11 月。

分布于云南(西双版纳、屏边、西畴)、贵州(罗甸、册亨)、广西(百色、上思、全州)、广东(连南、海南儋县及保亭)和江西(武功山)。生于林中和林缘,垂直分布海拔可达 1400 米。锡金、印度、缅甸、马来西亚和越南也有分布。

根皮为民间草药,有消肿散瘀,除风祛湿之效,治肝炎、肾炎、前列腺炎等症。

3. 棘茎榕木(中国高等植物图鉴)

Aralia echinocaulis Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 704. t. 11. f. 8. 1933; 陈焕镛, 中山大学农林植物所专刊 4: 247. 1940; Li in Sargentia 2: 111. 1942; 中国高等植物图鉴 2: 1043. f. 3815. 1972.

小乔木,高达 7 米;小枝密生细长直刺,刺长 7—14 毫米。叶为二回羽状复叶,长 35—50 厘米或更长;叶柄长 25—40 厘米,疏生短刺;托叶和叶柄基部合生,栗色;羽片有小叶 5—9,基部有小叶 1 对;小叶片膜质至薄纸质,长圆状卵形至披针形,长 4—11.5 厘米,宽 2.5—5 厘米,先端长渐尖,基部圆形至阔楔形,歪斜,两面均无毛,下面灰白色,边缘疏生细锯齿,侧脉 6—9 对,上面较下面明显,网脉在上面略下陷,下面略隆起,不甚明显;小叶无柄或几无柄。圆锥花序大,长 30—50 厘米,顶生;主轴和分枝有糠屑状毛,后毛脱落;伞形花序直径约 1.5 厘米,有花 12—20 朵,稀 30 朵;总花梗长 1—5 厘米;苞片卵状披针形,长 10 毫米;花梗长 8—30 毫米;小苞片披针形,长约 4 毫米;花白色;萼无毛,边缘有 5 个卵状三角形小齿;花瓣 5,卵状三角形,长约 2 毫米;雄蕊 5,花丝长约 4 毫米;子房 5 室;花柱 5,离生。果实球形,直径 2—3 毫米,有 5 稜;宿存花柱长 1—1.5 毫米,基部合生。花期 6—8 月,果期 9—11 月。

分布于四川(天全、石棉、黑水、奉节)、云南(景东)、贵州(梵净山)、广西(灵川、资源)、广东(连山、乐昌、英德)、福建(建宁)、江西(铅山、萍乡、宜丰)、湖北(巴东)、湖南(永顺)、安徽(黄山)和浙江(昌化、天目山)。生于森林中,垂直分布海拔可达 2600

米。模式标本采自湖南武冈。

本种小叶片下面灰白色和白背叶槲木(变种) *Aralia chinensis* Linn. var. *nuda* Nakai 相似,但小枝密生长刺,小叶片下面无毛,可以区别。

4. 澜沧槲木(植物分类学报增刊)

Aralia lantsangensis Hoo, 植物分类学报增刊 1: 171. 1965.

小乔木,高 3.5 米,有刺。叶为二回羽状复叶,叶轴和羽片轴无毛,偶有细刺,刺长约 1 毫米;羽片长达 60 厘米或更长,有小叶 5—11,基部有小叶 1 对;小叶片薄纸质,卵状披针形,长 10—15 厘米,宽 4—5 厘米,先端长渐尖,基部心形,干时上面暗栗色,有光泽,脉上疏生少数细刺,无毛,下面淡棕色,无毛,边缘有钝齿,齿有刺尖,侧脉 8—10 对,两面隆起而明显,网脉在上面不明显,下面明显;两侧的小叶无柄,顶生小叶有长至 3 厘米的柄。圆锥花序大,一级分枝长达 30 厘米,二级分枝长 10—16 厘米,总状排列,无毛;伞形花序总状排列,直径 3—3.5 厘米,有花 10—15 朵;总花梗细长,长 2.5—4 厘米,无毛或几无毛;苞片披针形,长约 5 毫米,小苞片披针形,长 1—3 毫米,边缘均有纤毛;花梗细长,丝状,长 10—15 毫米,无毛;花淡绿白色;萼倒圆锥形,无毛,长约 3 毫米,边缘有 5 个三角形尖齿;花瓣 5,长圆状卵形,长约 2.5 毫米;雄蕊 5,花丝长约 3 毫米;子房 5 室;花柱 5,离生,直立。果实未见。花期 12 月。

产于云南西南部。生于海拔 800 米上下的沟边森林中。模式标本采自云南版纳勐往。

5. 小叶槲木

Aralia foliolosa (Wall.) Seem. in Journ. Bot. 6: 134 (Revis. Heder. 91. 1868) 1868; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 723. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 419. 1911; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Li in Sargentia 2: 106. 1942 — *Panax foliolosum* Wall. List. no. 4928. 1832, nom. nud.

多刺大灌木;刺短,粗壮。叶为二回或三回羽状复叶,叶轴和羽片轴通常疏生刺;羽片有小叶 5—9,基部有小叶 1 对;小叶片纸质,椭圆形至长圆状卵形,长 3.5—9 厘米,宽 1.5—4.5 厘米,先端渐尖,基部圆形,上面无毛或有微毛,下面脉上略有柔毛,边缘疏生锯齿,侧脉 6—8 对,上面不甚明显;下面明显,网脉在上面略下陷,下面不甚明显;小叶无柄或有长达 3 毫米的柄。圆锥花序大,分枝长达 30—45 厘米,稀疏,无毛,无刺或疏生细刺;伞形花序直径 3.5—4 厘米,有花 10—15 朵;总花梗长 1—3 厘米,无毛或几无毛;苞片狭长圆形,膜质,长 5—10 毫米,宿存;花梗长 1.5—2 厘米,无毛或几无毛;小苞片长 1—2.5 毫米,宿存;萼无毛,长约 2 毫米,边缘有 5 个三角形小齿;花瓣 5,