

米。模式标本采自湖南武冈。

本种小叶片下面灰白色和白背叶槲木(变种) *Aralia chinensis* Linn. var. *nuda* Nakai 相似,但小枝密生长刺,小叶片下面无毛,可以区别。

4. 澜沧槲木(植物分类学报增刊)

Aralia lantsangensis Hoo, 植物分类学报增刊 1: 171. 1965.

小乔木,高 3.5 米,有刺。叶为二回羽状复叶,叶轴和羽片轴无毛,偶有细刺,刺长约 1 毫米;羽片长达 60 厘米或更长,有小叶 5—11,基部有小叶 1 对;小叶片薄纸质,卵状披针形,长 10—15 厘米,宽 4—5 厘米,先端长渐尖,基部心形,干时上面暗栗色,有光泽,脉上疏生少数细刺,无毛,下面淡棕色,无毛,边缘有钝齿,齿有刺尖,侧脉 8—10 对,两面隆起而明显,网脉在上面不明显,下面明显;两侧的小叶无柄,顶生小叶有长至 3 厘米的柄。圆锥花序大,一级分枝长达 30 厘米,二级分枝长 10—16 厘米,总状排列,无毛;伞形花序总状排列,直径 3—3.5 厘米,有花 10—15 朵;总花梗细长,长 2.5—4 厘米,无毛或几无毛;苞片披针形,长约 5 毫米,小苞片披针形,长 1—3 毫米,边缘均有纤毛;花梗细长,丝状,长 10—15 毫米,无毛;花淡绿白色;萼倒圆锥形,无毛,长约 3 毫米,边缘有 5 个三角形尖齿;花瓣 5,长圆状卵形,长约 2.5 毫米;雄蕊 5,花丝长约 3 毫米;子房 5 室;花柱 5,离生,直立。果实未见。花期 12 月。

产于云南西南部。生于海拔 800 米上下的沟边森林中。模式标本采自云南版纳勐往。

5. 小叶槲木

Aralia foliolosa (Wall.) Seem. in Journ. Bot. 6: 134 (Revis. Heder. 91. 1868) 1868; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 723. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 419. 1911; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Li in Sargentia 2: 106. 1942 — *Panax foliolosum* Wall. List. no. 4928. 1832, nom. nud.

多刺大灌木;刺短,粗壮。叶为二回或三回羽状复叶,叶轴和羽片轴通常疏生刺;羽片有小叶 5—9,基部有小叶 1 对;小叶片纸质,椭圆形至长圆状卵形,长 3.5—9 厘米,宽 1.5—4.5 厘米,先端渐尖,基部圆形,上面无毛或有微毛,下面脉上略有柔毛,边缘疏生锯齿,侧脉 6—8 对,上面不甚明显;下面明显,网脉在上面略下陷,下面不甚明显;小叶无柄或有长达 3 毫米的柄。圆锥花序大,分枝长达 30—45 厘米,稀疏,无毛,无刺或疏生细刺;伞形花序直径 3.5—4 厘米,有花 10—15 朵;总花梗长 1—3 厘米,无毛或几无毛;苞片狭长圆形,膜质,长 5—10 毫米,宿存;花梗长 1.5—2 厘米,无毛或几无毛;小苞片长 1—2.5 毫米,宿存;萼无毛,长约 2 毫米,边缘有 5 个三角形小齿;花瓣 5,

长卵形,长约2毫米;雄蕊5,花丝长约3毫米;子房5室;花柱5,离生。果实未见。

产云南(思茅)和湖南。越南、印度、锡金也有分布。模式标本采自印度。

6. 黄毛櫟木(中国高等植物图鉴) 鸟不企(广州植物志) 图版19:1—4

Aralia decaisneana Hance in Journ. Bot. 4: 172. 1866 & in Ann. Sci. Nat. 5. Bot. 5: 215. 1866; Seem. in Journ. Bot. 6: 133 (Revis. Heder. 90. 1868) 1868; Nakai in Journ. Arn. Arb. 5: 32. 1924; Kanehira, Formos. Trees. rev. ed. 518. f. 479. 1936; Merr. & Chun 中山大学农林植物所专刊 5: 152. 1940; Li in Sargentia 2: 111. 1942 & Woody Fl. Taiwan 666. f. 272. 1963; 侯宽昭等, 广州植物志 455. 1956; 林来官, 福建师院学报第一期下卷 161. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 1043. f. 3816. 1972 — *Aralia planchoniana* Hance in Journ. Bot. 4: 172. 1866; Seem. l. c. 6: 133 (Revis. Heder. 90. 1868) 1868 — *Aralia spinosa* auct. non Linn.: Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 338. 1888, pro parte — *Aralia chinensis* auct. non Linn.: Benth. Fl. Hongk. 135. 1861; Harms in Bot. Jahrb. 23: 17. 1896; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 140. 1928.

灌木,高1—5米;茎皮灰色,有纵纹和裂隙;新枝密生黄棕色绒毛,有刺;刺短而直,基部稍膨大。叶为二回羽状复叶,长达1.2米;叶柄粗壮,长20—40厘米,疏生细刺和黄棕色绒毛;托叶和叶柄基部合生,先端离生部分锥形,外面密生锈色绒毛;叶轴和羽片轴密生黄棕色绒毛;羽片有小叶7—13,基部有小叶1对;小叶片革质,卵形至长圆状卵形,长7—14厘米,宽4—10厘米,先端渐尖或尾尖,基部圆形,稀近心形,上面密生黄棕色绒毛,下面毛更密,边缘有细尖锯齿,侧脉6—8对,两面明显,网脉不明显;小叶无柄或有长达5毫米的柄,顶生小叶柄长达5厘米。圆锥花序大;分枝长达60厘米,密生黄棕色绒毛,疏生细刺;伞形花序直径约2.5厘米,有花30—50朵;总花梗长2—4厘米;苞片线形,长0.8—1.5厘米,外面密生绒毛;花梗长0.8—1.5厘米,密生细毛;小苞片长3—4毫米,宿存;花淡绿白色;萼无毛,长约2毫米,边缘有5小齿;花瓣卵状三角形,长约2毫米;雄蕊5,花药白色,花丝长2.5—3毫米;子房5室;花柱5,基部合生,上部离生。果实球形,黑色,有5稜,直径约4毫米。花期10月至次年1月,果期12月至次年2月。

分布广,西自云南南部(思茅、西畴),向东经贵州(独山)、广西(百色、南宁)、广东及东南沿海岛屿、江西(龙南、寻乌)、安徽(黄山)而至福建和台湾。生于阳坡或疏林中,海拔数十米至1000米。

本种根皮为民间草药,有祛风除湿,散瘀消肿之效,可治风湿腰痛、肝炎及肾炎水