

肿。

7. 云南槲木(中国树木分类学)

Aralia thomsonii Seem. in Journ. Bot. 6: 134 (Revis. Heder. 91. 1868) 1868; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 723. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 419. 1911; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; W. W. Smith in Notes. Bot Gard. Edinb. 17: 343. 1930; 陈嵘, 中国树木分类学 930. 1937; Li in Sargentia 2: 112. 1942.

灌木, 高 2—4 米, 胸径可达 16 厘米; 小枝密生灰色或淡黄灰色长柔毛, 有刺; 刺短而粗壮, 长 1—2 毫米。叶大, 二回或三回羽状复叶, 叶轴和羽片轴密生长柔毛; 叶柄长达 40 厘米; 托叶和叶柄基部合生, 先端离生部分线形, 长约 1 厘米; 羽片有小叶 5—11, 基部有小叶 1 对; 小叶片纸质至薄革质, 椭圆形至卵状长圆形, 长 7—15 厘米, 宽 3—7 厘米, 先端长渐尖, 基部圆形至近心形, 稀阔楔形, 两面密生黄褐色长柔毛, 有时毛脱落仅沿脉有毛, 边缘或中部以上有细锯齿, 侧脉 8—10 对, 上面不及下面明显, 网脉在上面不明显, 下面明显; 小叶无柄或几无柄, 顶生者有长达 2.5 厘米的柄。圆锥花序大, 长达 90 厘米, 稀疏, 主轴及分枝有长柔毛; 伞形花序直径 2.5 厘米, 有花 15—20 朵; 总花梗长 1—5 厘米, 有短柔毛; 苞片披针形, 长 5—7 毫米, 小苞片长 4—5 毫米, 均密生短柔毛; 花梗长 8—10 毫米, 密生短柔毛; 花淡绿白色; 萼无毛, 长 1.5—2 毫米, 边缘有 5 个三角形小齿; 花瓣 5, 卵状三角形, 长 1.5—2 毫米; 子房 5 室; 花柱 5, 离生。果实球形, 黑色, 直径约 3.5 毫米, 有 5 稜。花期 6—8 月, 果期 10—11 月。

分布于云南(西双版纳、西畴、凤庆), 广西(凌云)。生于林缘、林中和山坡沟边, 海拔 1000—2000 米。印度也有分布。

8. 秀丽槲木(植物分类学报)

Aralia elegans C. N. Ho, 植物分类学报 2: 77. pl. 6. 1953.

灌木; 小枝疏生细长直刺, 刺长 6—7 毫米。叶为二回羽状复叶, 长 30—40 厘米; 叶柄长约 10 厘米, 无毛, 无刺或疏生刺; 羽片有小叶 5—11, 基部有小叶 1 对; 小叶片薄纸质, 卵形或卵状披针形, 长 3—6 厘米, 宽 1.2—2 厘米, 先端渐尖或长渐尖, 基部圆形或阔楔形, 略歪斜, 上面无毛或疏生短刺毛, 下面灰绿色, 无毛, 边缘疏生锯齿, 侧脉 4—6 对, 两面明显, 网脉不明显; 小叶柄长 1—3 毫米, 顶生者长 5—15 毫米。圆锥花序稀疏, 分枝紫棕色, 长 10—15 厘米, 无毛; 伞形花序小, 直径 1—1.3 厘米, 有花多数或 8—15 朵; 总花梗长 5—15 毫米, 花梗长 2—5 毫米, 均有粗毛, 稀无毛; 花淡绿色;