

肿。

7. 云南槲木(中国树木分类学)

Aralia thomsonii Seem. in Journ. Bot. 6: 134 (Revis. Heder. 91. 1868) 1868; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 723. 1879; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 419. 1911; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; W. W. Smith in Notes. Bot Gard. Edinb. 17: 343. 1930; 陈嵘, 中国树木分类学 930. 1937; Li in Sargentia 2: 112. 1942.

灌木, 高 2—4 米, 胸径可达 16 厘米; 小枝密生灰色或淡黄灰色长柔毛, 有刺; 刺短而粗壮, 长 1—2 毫米。叶大, 二回或三回羽状复叶, 叶轴和羽片轴密生长柔毛; 叶柄长达 40 厘米; 托叶和叶柄基部合生, 先端离生部分线形, 长约 1 厘米; 羽片有小叶 5—11, 基部有小叶 1 对; 小叶片纸质至薄革质, 椭圆形至卵状长圆形, 长 7—15 厘米, 宽 3—7 厘米, 先端长渐尖, 基部圆形至近心形, 稀阔楔形, 两面密生黄褐色长柔毛, 有时毛脱落仅沿脉有毛, 边缘或中部以上有细锯齿, 侧脉 8—10 对, 上面不及下面明显, 网脉在上面不明显, 下面明显; 小叶无柄或几无柄, 顶生者有长达 2.5 厘米的柄。圆锥花序大, 长达 90 厘米, 稀疏, 主轴及分枝有长柔毛; 伞形花序直径 2.5 厘米, 有花 15—20 朵; 总花梗长 1—5 厘米, 有短柔毛; 苞片披针形, 长 5—7 毫米, 小苞片长 4—5 毫米, 均密生短柔毛; 花梗长 8—10 毫米, 密生短柔毛; 花淡绿白色; 萼无毛, 长 1.5—2 毫米, 边缘有 5 个三角形小齿; 花瓣 5, 卵状三角形, 长 1.5—2 毫米; 子房 5 室; 花柱 5, 离生。果实球形, 黑色, 直径约 3.5 毫米, 有 5 稜。花期 6—8 月, 果期 10—11 月。

分布于云南(西双版纳、西畴、凤庆), 广西(凌云)。生于林缘、林中和山坡沟边, 海拔 1000—2000 米。印度也有分布。

8. 秀丽槲木(植物分类学报)

Aralia elegans C. N. Ho, 植物分类学报 2: 77. pl. 6. 1953.

灌木; 小枝疏生细长直刺, 刺长 6—7 毫米。叶为二回羽状复叶, 长 30—40 厘米; 叶柄长约 10 厘米, 无毛, 无刺或疏生刺; 羽片有小叶 5—11, 基部有小叶 1 对; 小叶片薄纸质, 卵形或卵状披针形, 长 3—6 厘米, 宽 1.2—2 厘米, 先端渐尖或长渐尖, 基部圆形或阔楔形, 略歪斜, 上面无毛或疏生短刺毛, 下面灰绿色, 无毛, 边缘疏生锯齿, 侧脉 4—6 对, 两面明显, 网脉不明显; 小叶柄长 1—3 毫米, 顶生者长 5—15 毫米。圆锥花序稀疏, 分枝紫棕色, 长 10—15 厘米, 无毛; 伞形花序小, 直径 1—1.3 厘米, 有花多数或 8—15 朵; 总花梗长 5—15 毫米, 花梗长 2—5 毫米, 均有粗毛, 稀无毛; 花淡绿色;

萼无毛,长约1.5毫米,边缘有5尖齿;花瓣5,长约2毫米;雄蕊5;子房5室;花柱5,离生。果实倒圆锥形,长约2毫米。花期7月。

产广东(清远)和广西(金秀)。生于山谷中。模式标本采自广西金秀。

9. 榑木(本草拾遗) 鹄不踏(本草纲目),虎阳刺(浙江土名),海桐皮(苏北土名),鸟不宿(苏南土名),通刺(福建土名),黄龙苞(四川宝兴土名),刺龙柏(四川峨眉土名),刺树椿、飞天蜈蚣(四川北碚土名) 图版19:5—8

Aralia chinensis Linn. Sp. Pl. 273. 1753; Seem. in Journ. Bot. 6: 133 (Revis. Heder. 90. 1868) 1868; Harms in Bot. Jahrb. 23: 17. 1896; Harms ex Diels in Bot. Jahrb. 29: 490. 1900; Harms & Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 2: 566. 1916; Vig. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 1160. 1923; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 703. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 930. 1937; Li in Sargentia 2: 109. 1942; 裴鉴、周太炎, 中国药用植物志 6: pl. 276. 1958; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 540. f. 877. 1959; 林来官, 福建师院学报第一期下卷 160. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 1042. f. 3813. 1972 —— *Aralia spinosa* auct. non Linn.: Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 338. 1888, pro parte.

榑木(原变种)

Aralia chinensis Linn. var. *chinensis*

灌木或乔木,高2—5米,稀达8米,胸径达10—15厘米;树皮灰色,疏生粗壮直刺;小枝通常淡灰棕色,有黄棕色绒毛,疏生细刺。叶为二回或三回羽状复叶,长60—110厘米;叶柄粗壮,长可达50厘米;托叶与叶柄基部合生,纸质,耳廓形,长1.5厘米或更长,叶轴无刺或有细刺;羽片有小叶5—11,稀13,基部有小叶1对;小叶片纸质至薄革质,卵形、阔卵形或长卵形,长5—12厘米,稀长达19厘米,宽3—8厘米,先端渐尖或短渐尖,基部圆形,上面粗糙,疏生糙毛,下面有淡黄色或灰色短柔毛,脉上更密,边缘有锯齿,稀为细锯齿或不整齐粗重锯齿,侧脉7—10对,两面均明显,网脉在上面不甚明显,下面明显;小叶无柄或有长3毫米的柄,顶生小叶柄长2—3厘米。圆锥花序大,长30—60厘米;分枝长20—35厘米,密生淡黄棕色或灰色短柔毛;伞形花序直径1—1.5厘米,有花多数;总花梗长1—4厘米,密生短柔毛;苞片锥形,膜质,长3—4毫米,外面有毛;花梗长4—6毫米,密生短柔毛,稀为疏毛;花白色,芳香;萼无毛,长约1.5毫米,边缘有5个三角形小齿;花瓣5,卵状三角形,长1.5—2毫米;雄蕊5,花丝长约3毫米;子房5室;花柱5,离生或基部合生。果实球形,黑色,直径约3毫米,有5稜;宿存花柱长1.5毫米,离生或合生至中部。花期7—9月,果期9—12月。