

或灌丛中,山坡路旁也有生长。模式标本采自广东乳源。

10. 圆叶榆木 图版 19:9—10

*Aralia caesia* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 702. 1933; Li, in Sargentia 2: 113. 1942 — *Aralia staphyleina* Hand.-Mazz. l. c. 7: 703. t. 11. f. 6. 1933.

灌木或小乔木,高1—8米,无刺。叶为一回或二回羽状复叶,长10—25厘米;叶柄长3—11厘米;托叶和叶柄基部合生,不明显;羽片有小叶5—7,基部有小叶一对;小叶片薄革质或厚纸质,卵形至圆形,长2.5—6厘米,宽2—5.5厘米,先端短尾尖,基部圆形至截形,上面深绿色,下面灰白色,两面均无毛,边缘有细锯齿,侧脉4—6对,两面明显,网脉明显;小叶无柄,或有长达1厘米的柄,顶生小叶柄长达3厘米。圆锥花序稀疏,长达30厘米;伞形花序直径2—2.5厘米,有花5—25朵;总花梗长1.5—4厘米,无毛;花梗长4毫米,结实后延长至15毫米,无毛;苞片披针形,长约5毫米;小苞片披针形,长约1.5毫米;萼无毛,长约2毫米,边缘有5个卵状三角形尖齿;花瓣5,卵状长圆形,长约2.5毫米,开花时反曲;子房5室;花柱5,离生。果实球形,有5稜,黑色,直径4—6毫米。

分布于四川(木里)、云南(丽江、中甸、禄劝)。生于森林中,海拔2400—3000米。模式标本采自云南中甸。

11. 西南榆木

*Aralia wilsonii* Harms in Sargent, Pl. Wils. 2: 567. 1916; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Li in Sargentia 2: 113. 1942 — *Aralia yunnanensis* auct. non Franch.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 703. 1933.

灌木,高2—3米;小枝无毛或几无毛,无刺。叶为二回羽状复叶,长15—30厘米;叶柄长5—10厘米;托叶和叶柄基部合生,不明显;羽片有小叶3—5,稀7,基部有小叶1对;小叶片纸质至革质,卵状长圆形至卵状披针形,长2—7厘米,宽1.5—3.5厘米,先端尖或渐尖,基部阔楔形至圆形,侧生小叶基部歪斜,两面均无毛或下面有绒毛,边缘有不整齐的锐尖细锯齿或重锯齿,侧脉约6对,两面明显,网脉隆起而明显;侧生小叶无柄或有长达4毫米的柄,顶生小叶柄长达1.5厘米。圆锥花序稀疏,分枝总状或几伞状排列;伞形花序直径2.5—3.5厘米,有花多数;总花梗细长,长3—6厘米;苞片三角状卵形,长约3毫米;花梗细长,长1.2—1.8厘米;小苞片卵形,长约1毫米;萼无毛,长2—3毫米,边缘有5个卵形的钝齿;花瓣5,卵状三角形,长约2毫米;子房5室;花柱5,离生。果实球形,直径5—6毫米,有5稜。花期7月,果期9—10月。



1—4. 黄毛楤木 *Aralia decaisneana* Hance, 1.枝叶; 2.圆锥花序的一部分; 3.花; 4.果实。5—8. 楤木 *Aralia chinensis* Linn., 5.叶的一部分; 6.圆锥花序的一部分; 7.花; 8.果实。9—10. 圆叶楤木 *Aralia caesia* Hand.-Mazz., 9.花枝; 10.果实。