

或灌丛中,山坡路旁也有生长。模式标本采自广东乳源。

10. 圆叶榆木 图版 19:9—10

Aralia caesia Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 702. 1933; Li, in Sargentia 2: 113. 1942 — *Aralia staphyleina* Hand.-Mazz. l. c. 7: 703. t. 11. f. 6. 1933.

灌木或小乔木,高1—8米,无刺。叶为一回或二回羽状复叶,长10—25厘米;叶柄长3—11厘米;托叶和叶柄基部合生,不明显;羽片有小叶5—7,基部有小叶一对;小叶片薄革质或厚纸质,卵形至圆形,长2.5—6厘米,宽2—5.5厘米,先端短尾尖,基部圆形至截形,上面深绿色,下面灰白色,两面均无毛,边缘有细锯齿,侧脉4—6对,两面明显,网脉明显;小叶无柄,或有长达1厘米的柄,顶生小叶柄长达3厘米。圆锥花序稀疏,长达30厘米;伞形花序直径2—2.5厘米,有花5—25朵;总花梗长1.5—4厘米,无毛;花梗长4毫米,结实后延长至15毫米,无毛;苞片披针形,长约5毫米;小苞片披针形,长约1.5毫米;萼无毛,长约2毫米,边缘有5个卵状三角形尖齿;花瓣5,卵状长圆形,长约2.5毫米,开花时反曲;子房5室;花柱5,离生。果实球形,有5稜,黑色,直径4—6毫米。

分布于四川(木里)、云南(丽江、中甸、禄劝)。生于森林中,海拔2400—3000米。模式标本采自云南中甸。

11. 西南榆木

Aralia wilsonii Harms in Sargent, Pl. Wils. 2: 567. 1916; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Li in Sargentia 2: 113. 1942 — *Aralia yunnanensis* auct. non Franch.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 703. 1933.

灌木,高2—3米;小枝无毛或几无毛,无刺。叶为二回羽状复叶,长15—30厘米;叶柄长5—10厘米;托叶和叶柄基部合生,不明显;羽片有小叶3—5,稀7,基部有小叶1对;小叶片纸质至革质,卵状长圆形至卵状披针形,长2—7厘米,宽1.5—3.5厘米,先端尖或渐尖,基部阔楔形至圆形,侧生小叶基部歪斜,两面均无毛或下面有绒毛,边缘有不整齐的锐尖细锯齿或重锯齿,侧脉约6对,两面明显,网脉隆起而明显;侧生小叶无柄或有长达4毫米的柄,顶生小叶柄长达1.5厘米。圆锥花序稀疏,分枝总状或几伞状排列;伞形花序直径2.5—3.5厘米,有花多数;总花梗细长,长3—6厘米;苞片三角状卵形,长约3毫米;花梗细长,长1.2—1.8厘米;小苞片卵形,长约1毫米;萼无毛,长2—3毫米,边缘有5个卵形的钝齿;花瓣5,卵状三角形,长约2毫米;子房5室;花柱5,离生。果实球形,直径5—6毫米,有5稜。花期7月,果期9—10月。

分布于四川(木里)和云南(丽江、鹤庆)。生于丛林中,海拔 2500—2700 米。模式标本采自四川汉源。

本种的模式标本叶无毛或几无毛,但采自云南及四川木里的标本小叶片下面却有绒毛。

12. 羽叶槲木

Aralia plumosa Li in *Sargentia* 2: 114. f. 14. 1942.

灌木,高 0.5—1.2 米;小枝灰色或淡灰棕色,无毛,无刺。叶为二回至三回羽状复叶,上部的为二回,下部的为三回复叶,长 15—20 厘米;叶柄细长;托叶和叶柄基部合生,不明显;羽片有小叶 3—5,基部有小叶 1 对,最下部的有小羽片 1 对;小叶片纸质,卵形至长圆状卵形,长 1.5—3.5 厘米,宽 0.8—2 厘米,先端渐尖,基部圆形或近心形,上面粗糙,下面密生白色绒毛,边缘有不整齐细锯齿或重锯齿,侧脉 4—5 对,两面明显,网脉在上面较下面明显;小叶无柄或有长达 9 毫米的柄,顶生小叶柄长 0.2—1.6 厘米。圆锥花序顶生,长约 30 厘米,分枝总状或近伞状;伞形花序直径 2.5—3.5 厘米,有花多数;总花梗长 2—9 厘米,无毛;苞片长圆形,长约 2 毫米;花梗纤细,长 1—1.5 厘米,无毛;小苞片长圆形,长约 1 毫米;花淡绿白色;萼无毛,长约 1.5 毫米,边缘有 5 个卵圆形钝齿;花瓣 5,长圆状卵形,长 2—2.5 毫米,开花时反曲;雄蕊 5,花丝长约 2 毫米;子房 5 室;花柱 5,合生至中部。果实球形,有 5 稜,直径约 4 毫米。花期 6—7 月,果期 8—10 月。

分布于四川(木里、九龙、冕宁)。生于丛林中,海拔 2300—2700 米(原记载说模式标本产于云南,因缺记录而具体地点不明。中国科学院北京植物研究所保藏的同号模式标本俞德浚 7337 及同举模式标本俞德浚 6320,均有采集记录,其产地均为四川木里,而非云南)。

原记载本种小叶片革质,下面网脉明显,萼长 2 毫米,花瓣长 3 毫米,此处系根据同号模式标本描写,和原记载略有出入。

本种的叶和西南槲木 *Aralia wilsonii* Harms 很相似,其区别点根据原记载在于本种叶为三回羽状复叶(实际是上部的为二回复叶,下部的为三回复叶)、最下部羽片基部有 1 对小羽片(具 3—5 个小叶,但常有 1 个小羽片退化为单小叶)、小叶片上面粗糙、下面有绒毛。但有些标本(如冯国楹 2916 采于四川木里,被李惠林定名为 *Aralia wilsonii* Harms)叶为二回羽状复叶,最下部羽片基部有 1 对小叶,小叶片下面有绒毛;有些标本(如综考队 60—008)叶为二至三回羽状复叶,小叶片则全无毛。故其主要区别点仅在于本种叶为二至三回羽状复叶,最下部羽片基部常有 1 对小羽片,小叶