

灌木,有刺;小枝灰棕色,有V形叶痕和刺;刺基部下延,扁平,长约6毫米,在基部的长10—12毫米。叶大,二回羽状复叶,长达65厘米或更长,羽片轴基部有小叶1对;羽片有小叶5—11;小叶片纸质,卵形至卵状长圆形,长7—11厘米,宽3.5—5厘米,先端长渐尖或长尾尖,基部圆形至心形,侧生小叶片基部歪斜,上面深绿色,下面灰白色,两面均无毛,边缘波状或有波状尖齿,侧脉约8对,两面明显,网脉不明显;小叶柄长3—10毫米,顶生者长至5厘米。圆锥花序大;分枝指状排列,长约30厘米,密生棕色柔毛;二级分枝总状排列,顶端单生1个伞形花序,其下有1—3个总状排列的小伞形花序;伞形花序直径1.5厘米,有花多数或少数;总花梗长至3厘米,有棕色粗毛;苞片膜质,披针形,长约3毫米;花梗长约5毫米,密生棕色粗毛;小苞片披针形,长约1毫米;萼无毛,长约1.2毫米,边缘有5个三角形小齿;花瓣5,长卵形,长约1.5毫米;雄蕊5;子房5室;花柱5,离生。果实球形,有5稜,直径约2毫米。

产台湾(阿里山)。生于海拔200—2100米间干燥地上。菲律宾和日本(冲绳)也有分布。

15. 糙叶槲木

Aralia scaberula Hoo, 植物分类学报增刊 1: 173. 1965.

灌木;小枝黄棕色,疏生少数皮孔和短刺,节上有时有短刺一圈;刺长1—2毫米,基部膨大。叶为二回羽状复叶;叶柄长15—20厘米,无毛,疏生少数短刺;托叶和叶柄基部合生,离生部分披针形,边缘有纤毛,长约5毫米;羽片有小叶3—5,基部有小叶1对;叶轴和羽片轴有小刺或无刺;小叶片纸质至薄革质,长圆状卵形,稀为卵形或披针形,顶生小叶片有时为长圆形,长6—12厘米,宽3—4.5厘米,先端长渐尖,基部阔楔形至圆形,两面脉上疏生短糙毛,余无毛,边缘有锐利疏锯齿,侧脉8—10对,和网脉在两面均隆起而明显;小叶无柄或有长5毫米的柄,顶生小叶柄长至5厘米。圆锥花序腋生,长约15厘米,直径12厘米;主轴短,长1.5厘米;分枝约6个,伞房状排列,密生短柔毛;伞形花序有花15—20朵,在分枝顶端轮生,在下部者总状排列;总花梗长1—1.8厘米,密生短柔毛;苞片在总花梗基部宿存,披针形,长3—5毫米,密生短柔毛,在总花梗中部另有较小的苞片2—3个;果梗基部的小苞片卵形,长约1毫米。花未见。果实近球形,长约5毫米,直径4毫米,黑色,有5稜;宿存花柱5,离生,反曲;果梗长约2毫米,密生短柔毛。

产福建。

本种小叶片较厚,网脉隆起而明显,除沿脉疏生短糙毛外无毛,圆锥花序较小,果梗短,和指序槲木组他种槲木不同。