

鲜、苏联和日本也有分布。

本种易和白背叶楤木(变种) *Aralia chinensis* Linn. var. *nuda* Nakai 相混, 但本种小叶片较薄, 圆锥花序伞房状, 分枝指状排列, 易于区别。

17. 粗毛楤木 图版20:1—4

*Aralia searelliana* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 498. 1903; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Li in Sargentia 2: 108. 1942; 何景、曾沧江, 植物分类学报增刊 1: 173. 1965.

小乔木, 高达 5 米, 胸径 8 厘米; 小枝密生黄色粗毛, 有刺; 刺短而粗, 基部膨大。叶大, 二回羽状复叶, 长达 2.5 米; 羽片有小叶 5—9, 基部有小叶 1 对; 小叶片革质, 卵形至长卵形, 长 12—18 厘米, 宽 7—9 厘米, 先端渐尖至长渐尖, 基部心形或近心形, 上面密生黄色粗毛, 下面毛更密, 边缘有锯齿或细锯齿, 侧脉 8—10 对, 上面略下陷, 下面略隆起, 明显, 网脉不明显。圆锥花序大, 长达 2 米; 主轴和分枝密生黄色粗毛, 有刺或无刺; 分枝长达 30 厘米, 在短主轴上指状排列; 伞形花序直径 1—2.5 厘米, 有花多数; 总花梗长 1—2 厘米, 花梗长 1—8 毫米, 均密生黄色粗毛; 苞片披针形, 长至 2 厘米, 小苞片披针形, 长 5—10 毫米, 外面均密生黄色粗毛; 萼无毛, 长约 1.5 毫米, 边缘有 5 个三角形小齿; 花瓣 5, 卵状三角形, 长约 1.5 毫米; 子房 5 室; 花柱 5, 离生。果实球形, 黑色, 直径约 3 毫米, 有 5 稜; 果梗长 3—8 毫米。花期 6 月, 果期次年 1 月。

分布于云南(景东、河口)。生于森林下, 海拔 1400—2400 米。模式标本采自云南思茅。

18. 湖北楤木 图版 20:5—8

*Aralia hupehensis* Hoo, 植物分类学报增刊 1: 172. 1965.

灌木或乔木, 高达 12 米; 小枝密生黄棕色绒毛, 有刺; 刺粗壮, 长 3—6 毫米, 密生黄棕色绒毛, 基部膨大。叶为二回羽状复叶; 托叶和叶柄基部合生, 深棕色, 先端离生部分披针形, 长约 5 毫米; 叶轴和羽片轴密生绒毛; 羽片对生, 有小叶 9, 基部有小叶 1 对; 小叶片纸质, 卵形至长圆状卵形, 长 8—13 厘米, 宽 3—6 厘米, 先端长渐尖或短渐尖, 基部圆形, 上面粗糙, 脉上密生细糙毛, 下面密生黄棕色绒毛, 边缘有锯齿, 齿有刺尖, 侧脉约 8 对, 隆起, 明显, 网脉明显; 小叶无柄或有长 3 毫米的柄, 密生黄棕色绒毛。圆锥花序顶生, 长 25—35 厘米, 主轴短, 长约 5 厘米; 分枝 2—5 个, 指状排列, 长 10—20 厘米, 密生黄棕色绒毛, 至果实成熟时无毛; 伞形花序在二级分枝上单个顶生, 或另有 1—2 个侧生伞形花序, 直径约 1.5 厘米, 有花 10—20 朵; 总花梗长 0.7—1.5 厘米, 花梗长 2—4 毫米, 均密生绒毛; 苞片披针形, 宿存, 长 2—3 毫米, 小苞片线



1—4. 粗毛楤木 *Aralia seareliana* Dunn, 1.羽片; 2.圆锥果序的一部分; 3.花; 4.果实。5—8. 湖北楤木 *Aralia hupehensis* Hoo, 5.叶的一部分; 6.圆锥花序的一部分; 7.花; 8.果实。9—12. 头序楤木 *Aralia dasphylla* Miq., 9.叶; 10.花序; 11.花; 12.果实。