

米,无毛或密生短柔毛;苞片线状披针形,长约2毫米;花梗长5—6毫米,有糠屑状毛;萼无毛,长约2毫米,边缘有5个三角形尖齿;花瓣5,卵状三角形,长约3毫米;雄蕊5,长3毫米;子房5室;花柱5,离生。果实球形,有5稜。花期6—8月,果期8—10月。

分布于四川(木里)、云南(德钦、鹤庆、嵩明)。生于森林下和山坡上,海拔1900—2800米。模式标本采自云南宾川鸡足山。

27. 柔毛龙眼独活

Aralia henryi Harms in Bot. Jahrb. 23: 12. 1896; Harms ex Diels in Bot. Jahrb. 29: 490. 1900; Li in Sargentia 2: 102. 1942—*Aralia pilosa* Franch. in Journ. de Bot. 10: 302 (Pl. Sin. Ecl. Prim. 21. 1897) 1896.

多年生草本,根茎短;地上茎高40—80厘米,有纵纹,疏生长柔毛。叶为二回或三回羽状复叶,长16—35厘米;叶柄长3—10厘米,无毛或疏生长柔毛;托叶和叶柄基部合生,先端离生部分披针形,长约5毫米;羽片有3小叶;小叶片膜质,长圆状卵形,长3.5—10厘米,宽2—6厘米,先端长尾尖,基部钝形至浅心形,侧生小叶片基部歪斜,两面脉上疏生长柔毛,边缘有钝锯齿,侧脉6—8对,稍明显,网脉不明显;小叶柄长3—5毫米,顶生者长达2厘米。圆锥花序伞房状,顶生;花序轴有长柔毛,基部有叶状总苞;伞形花序有花3—10朵;总花梗长5—10毫米;花梗短,长2—3毫米,丝状;萼无毛,长2.5毫米;萼齿5,长圆形,长约1毫米,先端钝圆;花瓣5,阔三角状卵形,长约1毫米;雄蕊5,长约1毫米;子房5室,稀3室;花柱5,稀3,离生。果实近球形,有5稜,直径约3毫米;宿存花柱长约1毫米,放射状,不外露;果梗丝状,长5—10毫米。花期7—8月,果期9—11月。

分布于陕西(洋县)、四川(雷波、金佛山)、湖北(兴山)和安徽(黄山附近)。生于森林下,海拔1500—2300米。模式标本采自湖北。

28. 龙眼独活 图版 21: 6—8

Aralia fargesii Franch. in Journ. de Bot. 10: 303 (Pl. Sin. Ecl. Prim. 22. 1897) 1896; Harms ex Diels in Bot. Jahrb. 29: 490. 1900; 钟心煊, 科学社丛刊 1: 189. 1924; Li in Sargentia 2: 103. 1942, pro parte.

多年生草本;地下茎厚而长,有肉质纺锤根1—2条;地上茎高达1米,有纵纹。叶长30—50厘米,茎上部者为一回或二回羽状复叶,下部者为二回或三回羽状复叶;叶柄无毛,长5—15厘米;托叶和叶柄基部合生,先端离生部分披针形,长约5毫米;羽片有小叶3—5;小叶片膜质,阔卵形或长圆状卵形,长8—15厘米,宽5—7厘米,先