

端渐尖,基部心形,侧生小叶片基部歪斜,两面脉上有糙毛,下面沿脉有短柔毛,边缘有重锯齿,侧脉 5—6 对,两面明显,网脉上面不明显,下面明显;小叶柄长 0.5—3 厘米,无毛或有疏毛,顶生小叶柄长至 5 厘米。圆锥花序伞房状,基部有叶状总苞,顶生及腋生;分枝少数,伞房状或伞状排列,无毛或疏生糙毛;伞形花序在分枝上总状排列,直径 1—1.5 厘米,有花 10—20 朵;总花梗长 1.5—6 厘米,无毛或有糙毛;苞片披针形,长 2—3 毫米;花梗长 2—5 毫米,密生糙毛;小苞片线形,长 1 毫米,早落;花紫色;萼长 2 毫米,外面疏生糙毛,边缘有 5 个三角形尖齿;花瓣 5,卵状三角形,长 2 毫米;雄蕊 5;子房 5 室;花柱 5,离生。果实近球形,长 5 毫米,有 5 稜。花期 7—8 月,果期 10—11 月。

分布于陕西(太白山)、四川(黑水、茂县、峨眉山、雷波)和云南(鹤庆、昆明、嵩明)。生于森林下或溪边,海拔 1800—2600 米。模式标本采自四川城口。

本种为民间草药,根治小儿痘症。

29. 浓紫龙眼独活

Aralia atropurpurea Franch. in Journ. de Bot. 10: 301 (Pl. Sin. Eel. Prim. 21. 1897) 1896; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 701. 1933; Li in Sargentia 2: 104. 1942.

多年生草本,地下有匍匐长根茎;地上茎高达 1.5 米,基部直径可达 1.5 厘米。叶为一回或二回羽状复叶,长 20—30 厘米;叶柄长 1—4 厘米,疏生短糙毛;叶轴和羽片轴通常疏生短糙毛;羽片有小叶 3—5;小叶片膜质,卵形至卵状披针形,长 3—8 厘米,宽 2—3 厘米,先端长渐尖,基部圆形或浅心形,两面沿脉疏生短糙毛,边缘有重锯齿,基部有放射脉 5—7 条,中脉上部有侧脉 2—4 对,略明显,网脉上面不明显,下面明显;侧生小叶柄长 0.5—2.5 厘米,顶生小叶柄长达 4 厘米。圆锥花序伞房状,顶生及腋生;伞形花序直径 1.5—2.2 厘米,有花 7—10 朵;总花梗长 3—7 厘米,疏生短糙毛;花梗长 5—10 毫米,有短糙毛;萼无毛,长约 1.5 毫米,边缘有 5 个三角形尖齿;花瓣 5,三角形,浓紫色;雄蕊 5;子房 5 室;花柱 5,离生。果实球形,黑色,有 5 稜,直径 4—5 毫米。花期 6—7 月,果期 8—9 月。

分布于西藏(波密)、四川(金川、康定、宝兴、石棉)和云南(德钦)。生于杂木林中 and 林缘路旁,海拔约 3000 米左右。模式标本采自云南洱源大龙潭。

本种和芹叶龙眼独活 *Aralia apioides* Hand.-Mazz. 相近,区别在于小叶片较大,侧生小叶柄较长,总花梗和花梗较长,萼齿先端尖等点不同。

30. 芹叶龙眼独活 图版 21:9—12