

亚至印度也有分布。

本种为本属分布最广的一种。全草入药，清热、利尿、消肿、解毒，治黄疸、赤白痢疾、目翳、喉肿、痈疽疮疮、跌打瘀伤。

3a. 破铜钱(植物名实图考) 鹅不食草(江西)、铜钱草(广西)、小叶铜钱草(安徽)。图版 2: 7—9

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. **batrachium** (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan in *Sinensia* 7: 480. 1936.——*Hydrocotyle batrachium* Hance in *Ann. Sc. Nat.* 4. ser. 18: 220. 1862.——*Hydrocotyle rotundifolia* Roxb. var. **batrachium** (Hance) Chermeson in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 68: 508. 1921. et in Lecomte, *Fl. Gen. Indo-Chine* 2: 1137. 1923.

与原种的区别为叶片较小，3—5 深裂几达基部，侧面裂片间有一侧或两侧仅裂达基部 1/3 处，裂片均呈楔形。

产于安徽、浙江、江西、湖南、湖北、台湾、福建、广东、广西、四川等省区。喜生在湿润的路旁、草地、河沟边、湖滩、溪谷及山地；海拔 150—2500 米。越南有分布。

全草入药，治砂淋、黄疸、肝炎、肾炎、肝火头痛、火眼、百日咳等。

4. 裂叶天胡荽(植物分类学报) 图版 3

Hydrocotyle dielsiana Wolff in Fedde *Repert. sp. Nov.* 27: 112. 1929.


细弱草本。茎直立或基部匍匐，高 15—30 厘米，不分枝或有极短而不超出 6 厘米长的侧枝，下部疏被柔毛或无毛，上部密被白色柔毛，节上生根。叶片长 2—4 厘米，宽 4—8 厘米，掌状 5—7 深裂，裂口近基部，中间裂片菱形、倒卵形至倒卵状披针形，长 1.5—3 厘米，两侧裂片短于中间裂片，裂片下部全缘，楔形，中部较阔，上部边缘有 5—6 个锯齿，齿直立或稍弯曲，两面疏被短的粗伏毛；叶脉 7 条，自基部射出，紫黑色；叶柄长 2.5—7 厘米；托叶膜质，全缘或有 2 裂。花序梗丝状，单生于茎的顶端，与叶对生或近腋生，长于叶柄，密生白色柔毛；小伞形花序有花 20—35，花较疏生；小总苞片长 1—1.2 毫米，膜质；花瓣白色，长卵形，长约 1.2 毫米，宽 0.7 毫米，有 1 条不明显的脉；花丝长 1.8—2.1 毫米，花药卵圆形；花柱长 0.7—1.1 毫米，果熟时向外反曲。果实近心状圆形，幼时淡紫色，成熟时棕色或棕褐色，长约 1.3 毫米，宽约 2.1 毫米，光滑，背棱及中棱明显凸起，合生面紧缩；果柄长 3—5 毫米。花果期 7 月。

产湖北巴东。生长在山坡路旁阴湿地；海拔 1200 米。模式标本采自湖北西部。

5. 普渡天胡荽(植物分类学报) 图版 4: 1—2

Hydrocotyle handelii Wolff in Hand.-Mazz. *Symb. Sin.* 7: 707. 1933.

多年生草本，匍匐茎短。茎直立或平卧上升，细弱，无毛，高 16—30 厘米，不分枝。叶互生，草质，心状圆形，长 2—4 厘米，宽 4—6 厘米，5—7 裂，裂口深达中部以下，几成直角；中间裂片长卵形或卵状披针形，中部与下部近等宽或较宽，边缘疏生不整齐的锯齿，齿



图版 2 1—3 密伞天胡荽 *Hydrocotyle pseudo-conferta* Masamune 1.植株; 2.果序; 3.果实。4—6 天胡荽 *H. sibthorpioides* Lam. 4.植株; 5.花; 6.果实。7—9 破铜钱 *H. sibthorpioides* Lam. var. *batrachium* (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan 7.植株; 8.叶; 9.果实。(蒋杏墙绘)