

亚至印度也有分布。

本种为本属分布最广的一种。全草入药，清热、利尿、消肿、解毒，治黄疸、赤白痢疾、目翳、喉肿、痈疽疮疡、跌打瘀伤。

3a. 破铜钱(植物名实图考) 鹅不食草(江西)、铜钱草(广西)、小叶铜钱草(安徽)。图版 2: 7—9

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. var. **batrachium** (Hance) Hand. -Mazz. ex Shan in *Sinensia* 7: 480. 1936.——*Hydrocotyle batrachium* Hance in *Ann. Sc. Nat.* 4. ser. 18: 220. 1862.——*Hydrocotyle rotundifolia* Roxb. var. **batrachium** (Hance) Chermeson in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 68: 508. 1921. et in Lecomte, *Fl. Gen. Indo-Chine* 2: 1137. 1923.

与原种的区别为叶片较小，3—5 深裂几达基部，侧面裂片间有一侧或两侧仅裂达基部 1/3 处，裂片均呈楔形。

产于安徽、浙江、江西、湖南、湖北、台湾、福建、广东、广西、四川等省区。喜生在湿润的路旁、草地、河沟边、湖滩、溪谷及山地；海拔 150—2500 米。越南有分布。

全草入药，治砂淋、黄疸、肝炎、肾炎、肝火头痛、火眼、百日咳等。

4. 裂叶天胡荽(植物分类学报) 图版 3

Hydrocotyle dielsiana Wolff in Fedde *Repert. sp. Nov.* 27: 112. 1929.

细弱草本。茎直立或基部匍匐，高 15—30 厘米，不分枝或有极短而不超出 6 厘米长的侧枝，下部疏被柔毛或无毛，上部密被白色柔毛，节上生根。叶片长 2—4 厘米，宽 4—8 厘米，掌状 5—7 深裂，裂口近基部，中间裂片菱形、倒卵形至倒卵状披针形，长 1.5—3 厘米，两侧裂片短于中间裂片，裂片下部全缘，楔形，中部较阔，上部边缘有 5—6 个锯齿，齿直立或稍弯曲，两面疏被短的粗伏毛；叶脉 7 条，自基部射出，紫黑色；叶柄长 2.5—7 厘米；托叶膜质，全缘或有 2 裂。花序梗丝状，单生于茎的顶端，与叶对生或近腋生，长于叶柄，密生白色柔毛；小伞形花序有花 20—35，花较疏生；小总苞片长 1—1.2 毫米，膜质；花瓣白色，长卵形，长约 1.2 毫米，宽 0.7 毫米，有 1 条不明显的脉；花丝长 1.8—2.1 毫米，花药卵圆形；花柱长 0.7—1.1 毫米，果熟时向外反曲。果实近心状圆形，幼时淡紫色，成熟时棕色或棕褐色，长约 1.3 毫米，宽约 2.1 毫米，光滑，背棱及中棱明显凸起，合生面紧缩；果柄长 3—5 毫米。花果期 7 月。

产湖北巴东。生长在山坡路旁阴湿地；海拔 1200 米。模式标本采自湖北西部。

5. 普渡天胡荽(植物分类学报) 图版 4: 1—2

Hydrocotyle handelii Wolff in Hand.-Mazz. *Symb. Sin.* 7: 707. 1933.

多年生草本，匍匐茎短。茎直立或平卧上升，细弱，无毛，高 16—30 厘米，不分枝。叶互生，草质，心状圆形，长 2—4 厘米，宽 4—6 厘米，5—7 裂，裂口深达中部以下，几成直角；中间裂片长卵形或卵状披针形，中部与下部近等宽或较宽，边缘疏生不整齐的锯齿，齿

直立或稍向外弯;两侧裂片略短于中间裂片,裂口亦较浅;裂片基部全缘,中部以上两边各有1浅裂,顶端尖锐,表面通常深绿色,密被粗伏毛,背面淡绿,平滑无毛;叶脉掌状,基部有毛;叶柄细弱,长3.5—13厘米。花序梗纤细,柔软,光滑,单生于茎的上部,与叶近对生或腋生,长过叶柄约1/2;小总苞片细小,略呈紫褐色;小伞形花序有花20—28;花白色,花柄纤细,长约0.6毫米;花瓣卵形,长约1.1毫米,宽0.5毫米;花柱长1—1.2毫米,幼时内卷,果熟时向外反曲。果实心状圆形,长约1.2毫米,宽2毫米。 花果期7—8月。

产四川(米易县)、云南(普渡河)。生长在山坡、路旁、林边、杂草地等潮湿地区;海拔2350米。模式标本采自云南普渡河。

6. 鄂西天胡荽(植物分类学报) 图版4: 3—5

Hydrocotyle wilsonii Diels ex Wolff in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 707. 1933. nomem nudum; 单人骅、刘守炉, 植物分类学报 9(2): 127. 1964.

多年生匍匐草本,匍匐茎淡黄色,光滑无毛,节上着生须根,有残存膜质卵形的托叶。茎直立或基部平卧上升,细弱,不分枝,高10—45厘米,密被短柔毛,有时下部无毛。叶片革质,圆肾形或心状肾形,长2—4厘米,宽3.5—7厘米,5—7深裂,裂口达叶片的中部至3/5,成锐角;中间裂片宽卵形或倒卵形,中部与基部等阔或较阔,中部以上两边具1浅裂,顶端短尖;两侧裂片倒卵形,有时在一侧或两侧再有1浅裂,最外裂片较中间裂片稍短;裂片边缘有复锯齿,两面均被粗伏毛;叶柄长4—12厘米,被柔毛;托叶膜质,有紫色斑点。花序梗纤细,单生于茎的上部,与叶对生,长于叶柄;苞片膜质,细小,密生在花柄基部;小伞形花序有多数花,花较疏生;花柄长2—4.5毫米,光滑;花瓣卵形,膜质,有紫红色斑点;花柱幼时内卷,果熟时极向外反曲。果幼时近圆球形,紫红色,熟后紫黑色,长约1.2毫米,宽1.8毫米,中棱及背棱隆起,基部浅心形或平截形。 花果期7—8月。


产湖北(巴东、建始)、四川(奉节)。喜生于湿润草地和竹林下;海拔1250—1780米。模式标本采自湖北巴东。

本种与普渡天胡荽 *Hydrocotyle handelii* Wolff 很相似,区别在于本种叶柄、叶片背面及花序梗均有毛,后者无毛。

7. 缅甸天胡荽(植物分类学报) 图版5

Hydrocotyle burmanica Kurz in Journ. As. Soc. Beng. 42(2): 60. 1874 et 46(2): 113. 1877; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 668. 1879; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 325. 1887; Dunn et Tutchner in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 116. 1912.

多年生草本,匍匐茎短,圆柱形,节上生须根。茎直立或基部平卧,高25—120厘米,有分枝,无毛。叶片膜质至纸质,阔卵状五角形或菱状五边形,长5—8厘米,宽7—12厘米,5浅裂,裂片顶端渐尖呈尾状,边缘有复锯齿,基部深心形,脉上疏生短刺毛,背面光



图版 4 1—2. 普渡天胡荽 *Hydrocotyle handelii* Wolff 1. 植株; 2. 果实。3—5. 鄂西天胡荽 *Hydrocotyle wilsonii* Diels ex Wolff 3. 植株; 4. 花序; 5. 花。(史渭清绘)