

直立或稍向外弯；两侧裂片略短于中间裂片，裂口亦较浅；裂片基部全缘，中部以上两边各有1浅裂，顶端尖锐，表面通常深绿色，密被粗伏毛，背面淡绿，平滑无毛；叶脉掌状，基部有毛；叶柄细弱，长3.5—13厘米。花序梗纤细，柔软，光滑，单生于茎的上部，与叶近对生或腋生，长过叶柄约1/2；小总苞片细小，略呈紫褐色；小伞形花序有花20—28；花白色，花柄纤细，长约0.6毫米；花瓣卵形，长约1.1毫米，宽0.5毫米；花柱长1—1.2毫米，幼时内卷，果熟时向外反曲。果实心状圆形，长约1.2毫米，宽2毫米。 花果期7—8月。

产四川(米易县)、云南(普渡河)。生长在山坡、路旁、林边、杂草地等潮湿地区；海拔2350米。模式标本采自云南普渡河。

6. 鄂西天胡荽(植物分类学报) 图版4: 3—5

Hydrocotyle wilsonii Diels ex Wolff in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 707. 1933. nomem nudum; 单人骅、刘守炉, 植物分类学报 9(2): 127. 1964.

多年生匍匐草本，匍匐茎淡黄色，光滑无毛，节上着生须根，有残存膜质卵形的托叶。茎直立或基部平卧上升，细弱，不分枝，高10—45厘米，密被短柔毛，有时下部无毛。叶片革质，圆肾形或心状肾形，长2—4厘米，宽3.5—7厘米，5—7深裂，裂口达叶片的中部至3/5，成锐角；中间裂片宽卵形或倒卵形，中部与基部等阔或较阔，中部以上两边具1浅裂，顶端短尖；两侧裂片倒卵形，有时在一侧或两侧再有1浅裂，最外裂片较中间裂片稍短；裂片边缘有复锯齿，两面均被粗伏毛；叶柄长4—12厘米，被柔毛；托叶膜质，有紫色斑点。花序梗纤细，单生于茎的上部，与叶对生，长于叶柄；苞片膜质，细小，密生在花柄基部；小伞形花序有多数花，花较疏生；花柄长2—4.5毫米，光滑；花瓣卵形，膜质，有紫红色斑点；花柱幼时内卷，果熟时极向外反曲。果幼时近圆球形，紫红色，熟后紫黑色，长约1.2毫米，宽1.8毫米，中棱及背棱隆起，基部浅心形或平截形。 花果期7—8月。

产湖北(巴东、建始)、四川(奉节)。喜生于湿润草地和竹林下；海拔1250—1780米。模式标本采自湖北巴东。

本种与普渡天胡荽 *Hydrocotyle handelii* Wolff 很相似，区别在于本种叶柄、叶片背面及花序梗均有毛，后者无毛。

7. 缅甸天胡荽(植物分类学报) 图版5

Hydrocotyle burmanica Kurz in Journ. As. Soc. Beng. 42(2): 60. 1874 et 46(2): 113. 1877; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 668. 1879; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 325. 1887; Dunn et Tutchner in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 116. 1912.

多年生草本，匍匐茎短，圆柱形，节上生须根。茎直立或基部平卧，高25—120厘米，有分枝，无毛。叶片膜质至纸质，阔卵状五角形或菱状五边形，长5—8厘米，宽7—12厘米，5浅裂，裂片顶端渐尖呈尾状，边缘有复锯齿，基部深心形，脉上疏生短刺毛，背面光



图版 5 缅甸天胡荽 *Hydrocotyle burmanica* Kurz

滑或在脉上偶有疏生短刺毛；叶脉7—9条自基部射出，其中有5—7条明显地伸达顶端；叶柄长7—19厘米，无毛；托叶膜质，卵圆形。花序梗单一，与叶对生，纤细，无毛，长6—16厘米，伞形花序有花30—55，花白色；小总苞片细小，密集。果实近圆形，基部浅心形或截形，两侧扁压，长约1.2毫米，宽1.6毫米，紫褐色，果柄光滑，长6—8毫米。花果期7—8月。

产广东(罗浮山)、云南(贡山至腾冲)。生长在河边、沟旁、杂木林等潮湿处；海拔1700米。缅甸也有分布。

8. 中华天胡荽(植物分类学报) 地弹花(四川米易)、铜钱草(四川城口)。图版6
Hydrocotyle chinensis (Dunn) Craib in Kew Bull. 58. 1911.—*Hydrocotyle javanica* var. *chinensis* Dunn ex Shan et S. L. Liou, 植物分类学报 9 (2): 129. 1964; 中国高等植物图鉴 2: 1048. 图 3826. 1972.

多年生匍匐草本，直立部分高8—37厘米，除托叶、苞片、花柄无毛外，余均被疏或密而反曲的柔毛，毛白色或紫色，有时在叶背具紫色疣基的毛，茎节着土后易生须根。叶片薄，圆肾形，长2.5—7厘米，宽3—8厘米，表面深绿色，背面淡绿色，掌状5—7浅裂；裂片阔卵形或近三角形，边缘有不规则的锐锯齿或钝齿，基部心形；叶柄长4—23厘米；托叶膜质，卵圆形或阔卵形。伞形花序单生于节上，腋生或与叶对生，花序梗通常长过叶柄；小伞形花序有花25—50，花柄长2—7毫米；小总苞片膜质，卵状披针形，长1.2—1.8毫米，顶端尖，边缘有时略呈撕裂状。花在蕾期草绿色，开放后白色；花瓣膜质，长1—1.2毫米，顶端短尖，有淡黄色至紫褐色的腺点。果实近圆形，基部心形或截形，两侧扁压，长1.3—2毫米，宽1.5—2.1毫米，侧面二棱明显隆起，表面平滑或皱折，黄色或紫红色。花果期5—11月。

产湖南、四川、云南。生长在河沟边及阴湿的路旁草地；海拔1060—2900米。模式标本采自云南蒙自。

全草入药，镇痛、清热、利湿，治腹痛、小便不利、湿疹等。

本种与红马蹄草 *Hydrocotyle nepalensis* Hook. 有很大区别，即本种具单一细长伞形花序梗，花柄也较长。

9. 肾叶天胡荽(植物分类学报) 水雷公根(广东临高)、冰大海(广东阳山)、透骨草(广东翁源)、大样雷公根(广东澄迈)、山灯盏(广西龙胜)、鱼藤草(广西全县) 图版 7: 1—5

Hydrocotyle wilfordi Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 31: 45. 1887; Forbes et Hemsl. in Journ. Soc. Bot. 23: 326. 1887; Dunn et Tutcher in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 116. 1912; Shan in Sinensia 7: 478. 1936; Hiroe, Umbell. Asia 1: 9. 1958. pro parte (as syn. of *H. ramiflora* Maxim.); 中国高等植物图鉴 2: 1049. 图 3828. 1972.