

滑或在脉上偶有疏生短刺毛；叶脉7—9条自基部射出，其中有5—7条明显地伸达顶端；叶柄长7—19厘米，无毛；托叶膜质，卵圆形。花序梗单一，与叶对生，纤细，无毛，长6—16厘米，伞形花序有花30—55，花白色；小总苞片细小，密集。果实近圆形，基部浅心形或截形，两侧扁压，长约1.2毫米，宽1.6毫米，紫褐色，果柄光滑，长6—8毫米。花果期7—8月。

产广东(罗浮山)、云南(贡山至腾冲)。生长在河边、沟旁、杂木林等潮湿处；海拔1700米。缅甸也有分布。

8. 中华天胡荽(植物分类学报) 地弹花(四川米易)、铜钱草(四川城口)。图版6
Hydrocotyle chinensis (Dunn) Craib in Kew Bull. 58. 1911.—*Hydrocotyle javanica* var. *chinensis* Dunn ex Shan et S. L. Liou, 植物分类学报 9 (2): 129. 1964; 中国高等植物图鉴 2: 1048. 图 3826. 1972.

多年生匍匐草本，直立部分高8—37厘米，除托叶、苞片、花柄无毛外，余均被疏或密而反曲的柔毛，毛白色或紫色，有时在叶背具紫色疣基的毛，茎节着土后易生须根。叶片薄，圆肾形，长2.5—7厘米，宽3—8厘米，表面深绿色，背面淡绿色，掌状5—7浅裂；裂片阔卵形或近三角形，边缘有不规则的锐锯齿或钝齿，基部心形；叶柄长4—23厘米；托叶膜质，卵圆形或阔卵形。伞形花序单生于节上，腋生或与叶对生，花序梗通常长过叶柄；小伞形花序有花25—50，花柄长2—7毫米；小总苞片膜质，卵状披针形，长1.2—1.8毫米，顶端尖，边缘有时略呈撕裂状。花在蕾期草绿色，开放后白色；花瓣膜质，长1—1.2毫米，顶端短尖，有淡黄色至紫褐色的腺点。果实近圆形，基部心形或截形，两侧扁压，长1.3—2毫米，宽1.5—2.1毫米，侧面二棱明显隆起，表面平滑或皱折，黄色或紫红色。花果期5—11月。


产湖南、四川、云南。生长在河沟边及阴湿的路旁草地；海拔1060—2900米。模式标本采自云南蒙自。

全草入药，镇痛、清热、利湿，治腹痛、小便不利、湿疹等。

本种与红马蹄草 *Hydrocotyle nepalensis* Hook. 有很大区别，即本种具单一细长伞形花序梗，花柄也较长。

9. 肾叶天胡荽(植物分类学报) 水雷公根(广东临高)、冰大海(广东阳山)、透骨草(广东翁源)、大样雷公根(广东澄迈)、山灯盏(广西龙胜)、鱼藤草(广西全县) 图版 7: 1—5

Hydrocotyle wilfordi Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 31: 45. 1887; Forbes et Hemsl. in Journ. Soc. Bot. 23: 326. 1887; Dunn et Tutcher in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 116. 1912; Shan in Sinensia 7: 478. 1936; Hiroe, Umbell. Asia 1: 9. 1958. pro parte (as syn. of *H. ramiflora* Maxim.); 中国高等植物图鉴 2: 1049. 图 3828. 1972.



图版 6 中华天胡荽 *Hydrocotyle chinensis* (Dunn) Craib

1. 植株； 2. 花序； 3. 花； 4. 花瓣； 5. 雄蕊； 6. 果实。（史渭清绘）