

1000—1100 米。印度、印度尼西亚也有。

以下 4 种未见标本,将这些种的原始记载翻译于下,供参考。

#### 14. 刺毛天胡荽(植物分类学报)

**Hydrocotyle setulosa** Hayata in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 25 (19): 102. 1908.; 单人骅、刘守炉,植物分类学报,9(2):133,1964。

多年生草本,节上生根。茎匍匐,嫩枝直立,有柔毛。叶柄长约 2 厘米,有向下反曲的柔毛;叶片肾形至心形,长 10 毫米,宽 13 毫米,7 裂,裂片钝,阔圆形,彼此贴近,边缘有圆锯齿,表面密被细刚毛,背面被柔毛或长刺毛;托叶阔圆形,全缘或 2 裂,膜质。伞形花序单生,花序梗长 2—3 厘米,有向下反曲的柔毛,花多数,花柄短,长 1 毫米,密集成头状。果实心形或圆形,长 1 毫米,宽 1.5 毫米,两侧扁压,两面有棱。

模式标本采自我国台湾。

本种近似肾叶天胡荽 *H. wilfordi* Maxim., 区别在于果实和有刺毛的叶片。

#### 15. 中甸天胡荽(植物分类学报)

**Hydrocotyle forrestii** Wolff in Fedde Repert. Sp. Nov. 27: 113. 1929.

茎匍匐,伸长,节上生根,上部有长分枝,疏生卷曲的短柔毛。叶片膜质,长 3—4 厘米,叶柄稍长于叶片,柄下部疏生、上部密生紫蓝色毛(干后);基部的托叶小,阔卵形,啮蚀状或稍有锯齿;叶片心状三角形,有棱角,表面疏生刺毛,背面密生刺毛,脉上更密,基部裂口几达中部,成锐角,不明显或达  $1/3$ ,上部 6—10 裂,小裂片阔三角形,钝圆或三角状圆形,顶端尖锐或有短尖头,边缘有不明显的圆锯齿或钝锯齿。伞形花序单生,花序梗长,下部光滑,上部疏生或密生柔毛,小总苞片无毛,卵形,长 1 毫米,宽 0.5 毫米,透明;花约 40,花柄毛状,结果的柄长 5—6 毫米,子房阔卵形。果实肾形,基部心形,黑褐色,有斑点,长 1.5 毫米,宽 2 毫米,从背部看,其棱将果实分成 4 个相等的部分,花盘平铺,内凹,花柱基膨大,花柱向外开展。

产西藏和云南西部。缅甸亦有分布。模式标本采自云南西部,澜沧江与怒江分水岭地带,北纬  $25^{\circ}30'$ ,东经  $98^{\circ}38'$ 。

#### 16. 吕宋天胡荽(植物分类学报)

**Hydrocotyle benguetensis** Elm. Leaflets Philipp. Bot. 2: 628. 1909.—  
*Hydrocotyle ranunculifolia* Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. 2: 151. 1933.

茎细长,略带肉质,匍匐或上升。叶片 3 深裂,圆形至卵形,长 10—25 毫米,宽 10—30 毫米,裂片 3 裂,疏生柔毛;叶柄长 3—15 厘米,有柔毛。伞形花序有花 2—13;花柄长 0.5—1 毫米;苞片宿存,长 0.3—0.5 毫米;花白色。果实近圆形,直径 0.8—1.5 毫米。

产我国台湾(台北、台东)。朝鲜、日本、菲律宾也有分布。

1936 年 Buwalda 将本种作为天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. 的异名,根据文献记载,本种叶片 3 深裂,裂片再行分裂,这些特征与天胡荽有区别;但和破