

Formos. 2: 49. 1912; Dunn et Tutcher, Fl. Kwangtung et Hongkong 116. 1912; de Boiss. in Lév. Fl. Kouy-tcheou 297. 1915.

多年生草本，茎匍匐，细长，节上生根。叶片膜质至草质，圆形、肾形或马蹄形，长1—2.8厘米，宽1.5—5厘米，边缘有钝锯齿，基部阔心形，两面无毛或在背面脉上疏生柔毛；掌状脉5—7，两面隆起，脉上部分叉；叶柄长1.5—27厘米，无毛或上部有柔毛，基部叶鞘透明，膜质。伞形花序梗2—4个，聚生于叶腋，长0.2—1.5厘米，有或无毛；苞片通常2，很少3，卵形，膜质，长3—4毫米，宽2.1—3毫米；每一伞形花序有花3—4，聚集呈头状，花无柄或有1毫米长的短柄；花瓣卵形，紫红色或乳白色，膜质，长1.2—1.5毫米，宽1.1—1.2毫米；花柱长约0.6毫米；花丝短于花瓣，与花柱等长。果实两侧扁压，圆球形，基部心形至平截形，长2.1—3毫米，宽2.2—3.6毫米，每侧有纵棱数条，棱间有明显的小横脉，网状，表面有毛或平滑。花果期4—10月。

分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、台湾、广东、广西、四川、云南等省区。喜生于阴湿的草地或水沟边；海拔200—1900米。印度、斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚、大洋洲群岛、日本、澳大利亚及中非、南非(阿扎尼亚)也有分布。

全草入药，清热利湿、消肿解毒，治痧气腹痛、暑泻、痢疾、湿热黄疸、砂淋、血淋，吐血、咳血、目赤、喉肿、风疹、疥癣、疔疮肿毒、跌打损伤等。

3. 马蹄芹属——*Dickinsia* Franch.

Franch. in Nouv. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 2 (8): 244. t. 8.

f. 9. 1886.——*Cotylonia* Normant in Journ. Bot. 60: 167. 1922.

一年生草本，根状茎短。茎柔弱，直立，无节。叶有长柄，叶柄基部有鞘，无托叶。总苞片2，叶状，无柄，对生。花序梗3—6，生于二叶状苞片之间；伞形花序有多数小花；萼齿微小或不显著；花瓣卵形，复瓦状排列；雄蕊5，花丝短于花瓣；花柱短，向外反曲，基部圆锥形。果实背腹扁压，近四棱形，分果近方形，背部稍突起，边缘扩大呈翅状，背部主棱5条，丝状，中棱稍隆起；心皮柄宿存；无油管。种子扁，长圆形。

本属有1种，仅产于我国西南各省区。

1. 马蹄芹 大苞芹(中国高等植物图鉴) 双叉草、山荷叶(四川) 图版11

Dickinsia hydrocotylodes Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 2 (8): 244. Pl. 8. f. A. 1886; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 491. 1900; de Boiss. in Bull. Soc. Bot. Fr. 53: 421. 1906; Wolff in Act. Hort. Gothob. 2: 289. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 708. 1933; Shan in Sinensia 7: 482. 1936; 中国高等植物图鉴 2: 1050. 图3829. 1972.——*Cotylonia bracteata* Norman. in Journ. Bot. 60: 167. 1922.

一年生草本，根状茎短，须根细长。茎直立，高20—46厘米，无节，光滑。基生叶圆形