

米,上部羽状分裂以至1—2浅裂。花序呈假总状花序,在花茎主枝下部的伞形花序近簇生,有短梗或近无梗,常1—4(—6)簇,每簇有伞辐2—7,顶端的伞辐4—12,长0.5—1厘米;总苞片卵状披针形,长1—2毫米;小总苞片5—8,线形,长约1毫米,宽0.5毫米;小伞形花序有花5—7,雄花4—6,通常5;花柄长2—3毫米;萼齿线状披针形或呈刺毛状;花瓣白色或淡蓝色以至蓝紫色,倒卵形或匙形,略长于萼齿,基部渐窄,顶端内凹,有1脉;花丝长达2毫米;两性花1朵,无柄,位于雄花中间,萼齿和花瓣同雄花;花柱长2.5—3毫米,向外伸展。果实球形或圆筒状卵形,长2毫米,表面有短而直的皮刺,上部的皮刺基部联合成薄层,棱槽上的皮刺有时不甚显著。分生果侧扁,横剖面呈圆形;胚乳腹面平直。油管5,在主棱下面明显。花果期3—7月。

产四川(南川、峨眉山)、云南。生长在溪边湿地、路旁竹林下或荫湿的杂木林下;海拔820—1550米。模式标本采自云南大关、盐津间的成凤山。

四川民间用全草作跌打损伤药。

8. 台湾变豆菜 图版19

Sanicula petagnioides Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 25(19): 103. 1908; Wolff in Engl. Pflanzenr. 61 (IV. 228): 55. 1913.

多年生矮小草本,高10—15厘米。根茎短,长不到1厘米,支根纤细。茎1—3,光滑,细弱,下部不分枝,上部叉状分枝。基生叶多数,纸质,肾圆形或心状五角形,长1—2厘米,宽2—3厘米,通常3—5裂至基部,中间裂片宽倒卵形或菱状倒卵形,有1—2毫米长的短柄,上部边缘有3浅裂或为不等的锯齿,齿端尖,两侧裂片各有1深裂,裂口深达基部或近基部2/3,内侧裂片同中间裂片,外侧裂片较小,所有裂片表面绿色,背面淡绿色,基部楔形,边缘有1—2浅裂和不规则的锯齿;叶柄长3—7厘米,基部有短的膜质鞘;茎生叶细小,无柄或有2毫米长的短柄,3裂,裂片倒卵状披针形,边缘疏生锯齿。花序通常顶生,叉状分枝,长1—6厘米;伞形花序4—8;伞辐长3—5毫米;总苞片线状披针形或呈刺毛状,长约1毫米,宽0.5毫米;小伞形花序有花5—6;雄花4—5,花柄长1—2毫米;萼齿线状披针形或刺毛状,长约1毫米、宽0.3毫米、花瓣白色、倒卵形、顶端略向内弯、中脉1条,花丝略长于花瓣,花药卵圆形;两性花1朵、位于雄花中间、无柄,花柱长约2毫米。果实长卵圆形或倒卵状球形,长1.5—2毫米,宽1—1.5毫米,下部平滑或有纵肋,上部脊上有直立的皮刺;油管细小,不明显。花果期3—10月。

特产我国台湾;生长在海拔2500—2700米的山坡林下。模式标本采自台湾。

9. 薄片变豆菜 鹅掌脚草(安徽)、山芹菜、野芹菜(广东)、散血草、肺筋草(四川) 图版20

Sanicula lamelligera Hance in Journ. Bot. Brit. & For. 16: 11. 1878;



图版 19 台湾变豆菜 *Sanicula petagnioides* Hayata
1. 植株; 2. 果实。