

0.5—2 毫米,表面无毛,背面沿脉具疏展糙毛;茎上部叶无柄,仅具叶鞘,叶裂片较细,常无毛。复伞形花序无总苞,直径 5—8 厘米,有 8—12 不等长的伞辐;小伞形花序有多数花,直径 1—2 厘米;花柄与果实近等长;小总苞片 8—12,卵形,膜质。果实长圆形,长 5—8 毫米,宽 1—1.5 毫米,果棱不显著,棱槽内油管单生,结合面 2 条,胚乳腹面有宽而微凹的槽。花期 5—6 月,果期 7 月。

产于新疆阿尔泰地区(哈巴河)。生于山地森林河谷、灌丛、杂草丛和草原洼地等处。苏联有分布。模式标本产阿尔泰地区。

7. 迷果芹属——*Sphallerocarpus* Bess. ex DC.

Bess. ex DC. *Mém. Ombell.* 60. 1829; DC. *Prodr.* 4: 230. 1830.

多年生草本。茎圆柱形,多分枝,有柔毛。叶片 2—3 回羽状分裂,裂片渐尖。复伞形花序顶生和侧生,伞辐多数;通常无总苞片;小总苞片 5,卵状披针形,边缘膜质;花白色,在顶生的伞形花序中几乎全是两性,侧生的伞形花序有时为雄性,花序外缘有时有辐射瓣;萼齿微小,不明显,卵状三角形或钻形;花瓣倒卵形;花柱短而直立或外折,花柱基圆锥形或平压状,全缘或呈波状皱褶。果实椭圆状长圆形,两侧微扁,合生面收缩,心皮有 5 条突出的波状棱,棱槽有油管 2—3,合生面 4—6;心皮柄 2 裂。种子近圆锥形,胚乳腹面有槽。

本属仅 1 种,产苏联西伯利亚东部及蒙古。我国东北和西北部。

本属模式种:迷果芹 *Chaerophyllum gracile* Bess. ex Trevir. *Sphallerocarpus gracilis* (Bess.) K.—Pol.

1. 迷果芹 小叶山红萝卜(河北宛平)、达扭(四川德格) 图版 32

Sphallerocarpus gracilis (Bess.) K.-Pol. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* N. S. 29: 202. 1915; Wolff in *Act. Hort. Gothob.* 2: 290. 1926; Schischk. in *Fl. URSS.* 16: 118. 1950; 辽宁省林业土壤研究所,东北草本植物志 6: 177. 1977.—*Sphallerocarpus cyminum* Bess. ex DC. *Mém. Ombell.* 60. 1829; DC. *Prodr.* 4: 230. 1830; Komarov *Fl. Mansh.* 3: 157. 1905; Shan in *Sinensia* 7: 81. 1937; 中国高等植物图鉴 2: 1054. 图 3838. 1972.—*Chaerophyllum cyminum* Fisch. in *Catal. Sem. Horti Vratissl. A.* 1821 nom. nud.—*Chaerophyllum gracile* Bess. ex Trevir. in *Acta Acad. Carol. Nat. Curios.* 13 (1): 172. 1826.—*Conopodium cyminum* Benth. et Hook. *Gen. Pl.* 1: 896. 1867; Franchet, *Pl. David.* 1: 140. 1884; Forbes et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 23: 330. 1888; de Boiss. in *Bull. de L'Herb. Boiss.* 53: 842. 1903 et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 53: 430. 1906.

多年生草本,高 50—120 厘米。根块状或圆锥形。茎圆形,多分枝,有细条纹,下部密