

被或疏生白毛,上部无毛或近无毛。基生叶早落或凋存;茎生叶2—3回羽状分裂,2回羽片卵形或卵状披针形,长1.5—2.5厘米,宽0.5—1厘米,顶端长尖,基部有短柄或近无柄;末回裂片边缘羽状缺刻或齿裂,通常表面绿色,背面淡绿色,无毛或疏生柔毛;叶柄长1—7厘米,基部有阔叶鞘,鞘棕褐色,边缘膜质,被白色柔毛,脉7—11条;序托叶的柄呈鞘状,裂片细小。复伞形花序顶生和侧生;伞辐6—13,不等长,有毛或无;小总苞片通常5,长卵形以至广披针形,长1.5—2.5毫米,宽1—2毫米,常向下反曲,边缘膜质,有毛;小伞形花序有花15—25;花柄不等长;萼齿细小;花瓣倒卵形,长约1.2毫米,宽1毫米,顶端有内折的小舌片;花丝与花瓣同长或稍超出,花药卵圆形,长约0.5毫米。果实椭圆状长圆形,长4—7毫米,宽1.5—2毫米,两侧微扁,背部有5条突起的棱,棱略呈波状,棱槽内油管2—3,合生面4—6;胚乳腹面内凹。花果期7—10月。

产于黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、内蒙古、甘肃、新疆、青海等地。生长在山坡路旁、村庄附近、菜园地以及荒草地上;海拔580—2800米。分布于蒙古和苏联西伯利亚东部、远东地区。

8. 峨参属——*Anthriscus* (Pers.) Hoffm.

Hoffm. Gen. Umbell. 1: 38. 1814; Pers. Syn. 1: 320. 1805. pro parte, non Bernh. (1800); Schischk. in Fl. URSS. 16: 125. 1950.
——*Chaerifolium* Hall. Hist. Stirp. Ind. Helv. 327. 1768.——
Chaefolium Hall. l. c. 328, 1768; Bess. Prim. Fl. Galic. 1: 218. 1903.

二或多年生草本,有细长圆锥根。茎直立,圆柱形,中空,有分枝,有刺毛或光滑。叶膜质,三出式羽状分裂或羽状多裂;叶柄有鞘。复伞形花序疏散,顶生或侧生;无总苞片;伞辐开展;小总苞片数枚,通常反折;花杂性,萼齿不明显;花瓣白色或黄绿色,长圆形或楔形,顶端内折,外缘花常有辐射瓣;花柱基圆锥形,花柱短;心皮柄通常不裂。果实长卵形至线形,顶端狭窄成喙状,两侧扁压,光滑或有刺毛,合生面通常收缩,果棱不明显或仅上部明显;果柄顶端有白色小刚毛。分生果的横剖面近圆形,胚乳腹面有深槽,油管不明显。

约20余种,分布于欧、亚、非、美洲。我国有2种。

本属模式种: 欧亚峨参 *Caucalis scandix* Scop. (*Anthriscus scandicina* (Weber) Manst.)

峨参属分种检索表

1. 果实表面光滑或疏生小瘤点……………1. 峨参 *A. sylvestris* (L.) Hoffm.
1. 果实表面密生疣毛或细刺毛……………2. 刺果峨参 *A. nemorosa* (M. Bieb.) Spreng.

1. 峨参(周太炎: 峨眉山之药用植物) 图版33: 1—4

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Gen. Umbell. 40. f. 14. 1814; DC.