

药,有驱风、透疹、健胃、祛痰之效。

14. 双球芹属——*Schrenkia* Fisch. et Meyer

Fisch. et Meyer in Schrenk Enum. Pl. Nov. 1: 65. 1841.

多年生草本。叶2—3回羽状全裂。复伞形花序顶生和侧生,有总苞和小总苞;花杂性,萼齿钻状披针形,宿存;花瓣白色,长圆形,顶端内折,微凹,基部具短爪;花柱基扁圆锥形,花柱外倾。果实膨大成双扁球状,不分离,果皮革质,分生果有5条不明显的龙骨状主棱和纵向细纹,油管不显著,胚乳腹面凹陷。

本属有7种,我国有1种。

本属模式种: 双球芹 *Schrenkia vaginata* (Ledeb.) Fisch. et Meyer

1. 双球芹 图版 41

Schrenkia vaginata (Ledeb.) Fisch. et Meyer in Schrenk Enum. Pl. Nov. 1: 65. 1841.——*Cachrys vaginata* Ledeb. Fl. Alt. 1: 366. 1829.

多年生草本,高30—50厘米。直根,木质化,稍肥厚,粗约1厘米。茎单一,基部围以残存的枯叶鞘,下部分枝互生,上部轮生或对生,或分枝成聚伞状。基生叶丛生,有短柄;茎生叶无柄,仅有扩大的叶鞘;叶片2—3回羽状分裂,末回裂片变化较大,长圆形至线形,长2—15毫米,宽1—2毫米,无毛。复伞形花序有8—16不等长的伞辐,直径5—10厘米;总苞片数目不定,狭披针形,发育过程中部分或全部陆续脱落;小伞形花序有6—14朵两性花,间有少量雄性花,花柄不等长,长者1厘米左右,中间的花几无柄;小总苞片8—10,线状披针形,边缘膜质,萼齿钻状披针形,宿存;花瓣白色,长圆形,顶端内折,微凹,有小舌片;花柱基扁圆锥形,花柱外倾或果期成水平状叉开。果实双扁球形,宽稍大于长,不分离,分生果直径约1—1.5毫米。花期5月;果期6月。

产我国新疆西部(塔城、阿尔泰)。生于山地草原带砾石质干山坡。苏联阿尔泰和中亚地区有分布。

3. 美味芹族——*Smyrnieae* Koch

Koch, Umbell. 133. 1824; Drude in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 8: 147. 1898.

花两性,萼齿不显或很小;花瓣通常有爪;花柱基短圆锥形或平压,或稍隆起。果实的横剖面圆形或通常侧面扁平;分生果的主棱5条,细线形或突起或有短翅;分生果的合生面通常收缩,有时果实近双球形;油管围绕着内果皮成环或每棱槽内有油管1—4;胚乳腹面呈半月形或马蹄形或有深槽;外果皮通常光滑,合生面无结晶簇。