

本变种与大苞矮泽芹的区别,在于羽片卵形或长卵形,长5—8毫米,宽3—4毫米,全缘或顶端1—3浅裂。小总苞片不分裂,线形或倒披针形。花果期8—9月。

产于四川(甘孜)。生长在湿润的草地或牧场;海拔3400—4050米。模式标本采自四川甘孜。

2. 松潘矮泽芹 图版 61

Chamaesium thalictrifolium Wolff in Acta Hort. Gothob. 2: 302. 1926.


光滑草本,高15—40厘米。主根细长,纺锤形,褐色。茎单生,直立,圆柱形,上部有分枝,基部常残留紫黑色的叶鞘。基生叶或较下部的叶柄长4—15厘米,中部以下的边缘有阔膜质的叶鞘,叶鞘抱茎,有脉数条;叶片的轮廓呈长圆形,长2.5—8厘米,宽1.5—3.5厘米,1回羽状分裂,羽片膜质或坚纸质,2—6对,每对彼此疏离,侧生的羽片卵形或阔卵形,长0.8—2厘米,宽0.7—1.7厘米,基部通常呈截形以至圆截形,顶端3—6裂或为不等锯齿,无柄,顶生的羽片阔倒卵形或近圆形,基部楔形,顶端常3裂,最上部的茎生叶柄呈鞘状,羽片卵形或长圆形,全缘或先端有1—3齿,所有的羽片表面绿色,背面淡绿色,叶脉两面隆起。复伞形花序顶生或腋生,顶生的花序梗粗壮,侧生的细弱;总苞片2—4,通常羽状分裂,裂片线形以至线状披针形;伞辐6—13,直立,开展,不等长,有沟纹,有时近四棱形;小总苞片2—5,线形,全缘或分裂,通常长于幼时的小伞形花序;小伞形花序有多数小花,花柄长2.5—3毫米;萼齿细小;花瓣白色或淡绿色,倒卵形或近圆形,长1.5—2毫米,宽1—1.2毫米,基部狭窄,顶端略向内弯,中脉1条;花丝与花瓣同长或略短,花药卵圆形;花柱基扁压,花柱在果熟时向外反曲。果实长圆形,长约2.5毫米,宽2毫米,基部略呈心形,主棱及次棱均隆起,胚乳腹面内凹,每棱槽有油管1。花果期7—8月。

产四川、云南、甘肃等省。生于山坡路旁及草丛;海拔3500—4040米。模式标本采自四川松潘。

3. 矮泽芹 图版 62

Chamaesium paradoxum Wolff in Notizbl. Bot. Gart. Berlin. 9: 275. 1925; Shan in Sinensia 8: 87. 1937; 中国高等植物图鉴 2: 1059. 图 3847. 1972.

二年生草本,高8—35厘米。主根圆锥形,长3—9厘米。茎单生,直立,有分枝,中空,基部常残留紫黑色的叶鞘。基生叶或茎下部的叶柄长4—6厘米,叶鞘有脉数条;叶片长圆形,长3—4.5厘米,宽1.5—3厘米,1回羽状分裂,羽片4—6对,每对相隔0.5—1厘米,羽片卵形或卵状长圆形以至卵状披针形,长7—15毫米,宽5—8毫米,通常全缘,很少在顶端具2—3齿,基部近圆截形或不明显的心形;茎上部的叶有羽片3—4对,呈卵状披针形以至阔线形,长5—15毫米,宽1—4毫米,全缘。复伞形花序顶生或腋生,顶生的花序梗粗壮,侧生的花序梗细弱;总苞片3—4,线形,全缘或分裂,短于伞辐;顶生的伞形花序有伞辐8—17,开展,不等长,最长可达10厘米;小总苞片线形,长3—4毫米。



图版 61 松潘矮泽芹 *Chamaesium thalictrifolium* Wolff

1. 植株； 2. 小伞花序； 3. 花； 4. 幼果。（史渭清绘）