

小伞形花序有多数小花，排列紧密，花柄长2—5毫米，花白色或淡黄色；萼齿细小，常被扩展的花柱基所掩盖；花瓣倒卵形，长约1.2毫米，宽1毫米，顶端浑圆，基部稍窄，脉1条；花丝长约1毫米，花药近卵圆形。果实长圆形，长1.5—2.2毫米，宽1—1.5毫米，基部略呈心形，主棱及次棱均隆起，合生面略收缩；心皮柄2裂；胚乳腹面内凹，每棱槽有油管1，合生面2。 花果期7—9月。

产四川、云南。生于山坡湿草地；海拔340—4800米。模式标本采自四川东俄洛。

#### 4. 绿花矮泽芹(拉汉种子植物名称) 图版63

**Chamaesium viridiflorum** (Franch.) Wolff ex Shan in *Sinensia* 8: 87. 1937.——*Trachydium viridiflorum* Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris Sér 8* (6): 111. 1894.


矮小，光滑草本，高3.5—32厘米。主根有细长的根茎，根茎上有膨大的小结节。茎单生，直立，有分枝，有纵沟纹，基部常残留纤维状的叶鞘。基生叶或茎下部的叶柄长1.5—6厘米，下部边缘有阔膜质的叶鞘；叶片轮廓呈长圆形，长1.5—3.5厘米，宽0.8—2.5厘米，1回羽状分裂，羽片膜质，2—4对，每对彼此疏离，侧生的羽片卵形，阔倒卵形或卵状长圆形，长4—12毫米，宽2—6毫米，顶端通常3浅裂，很少无裂，顶生的羽片阔倒卵形以至扇形，3—5裂，所有的羽片表面绿色，背面淡绿色。较上部的茎生叶常有阔膜质的叶柄，羽片卵状披针形以至阔线形，全缘。复伞形花序顶生或腋生，花序梗细弱，长1.5—8厘米；总苞片2—5，全缘或有分裂；顶生的伞形花序有伞辐6—11，开展，纤细，不等长；小总苞片无或偶有1—2，短于花柄；小伞形花序有花7—15，花柄近等长，长3—6毫米，排列疏松；萼齿极小；花瓣草绿色，倒卵形，长1—1.2毫米，宽约1毫米，基部较窄，顶端钝；花丝短于花瓣；花药近圆形，长约0.4毫米；花柱基扁压，扩展，花柱幼时直立，果时向外反折。果实卵形或长卵形，长约1.5毫米，宽与长几相等，基部略呈心形，两侧微扁，胚乳腹面微凹，每槽有油管1，合生面2。 花果期7—8月。

产四川、云南。生长在山坡路旁或林下；海拔3500—4200米。模式标本采自云南马耳山。

#### 5. 鹤庆矮泽芹(新组合) 图版64

**Chamaesium delavayi** (Franch.) Shan et S. L. Liou comb. nov.——*Trachydium delavayi* Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris Sér. 8*: 110. 1894.

矮小草本，高10—20(33)厘米。茎直立，基部通常残留紫黑色的膜质鞘，下部不分枝，有纵沟纹。基生叶的柄长2.5—5厘米，叶鞘膜质，下部抱茎；叶片轮廓呈长圆形，长3—6厘米，宽1.5—2.5厘米，1回羽状分裂，羽片4—6对，无柄，彼此相接或在下部1—2对稍有疏离，侧生的羽片阔卵形或卵圆形，长8—15毫米，宽6—13毫米，或长宽相等，基部截形，顶端钝，3浅裂或有2—3个圆锯齿，顶生的羽片近圆形，通常3裂以至缺刻。序托叶的柄呈鞘状，羽片长卵形或卵状披针形，长5—10毫米，宽2—4毫米，全缘。复伞



图版 63 绿花矮泽芹 *Chamaesium viridiflorum* (Franch.) Wolff ex Shan

1. 植株; 2. 小伞花序; 3. 花; 4. 花瓣; 5. 果序(幼); 6. 果实。(史渭清绘)