

Boiss. in Bull. Soc. Bot. France 53: 43. 1906.——*P. meoides* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 493. 1900. syn. nov.——*P. limprichtii* Wolff in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 477. 1922. syn. nov.

多年生草本，高 20—35 厘米，全体无毛。根粗壮，暗褐色，径 0.5—1 厘米，下部分枝，茎直立，通常不分枝或有少数分枝，带紫色，有条棱。基生叶或下部的叶有长柄，基部扩展成膜质抱茎的鞘，叶片轮廓三角状卵形，长 5—8 厘米，3—4 回羽状全裂，末回裂片线形，长 1.5—3 毫米，宽 0.3—0.5 毫米，茎上部叶有短柄或近无柄。复伞形花序通常单一，稀 2—3，径 3.5—4.5 厘米；总苞片 5—7，卵状椭圆形或倒卵形，长 1.5—2 厘米，宽 5—8 毫米，大部白色膜质，顶端呈叶状细裂，常带紫色；伞辐 9—15，长 1.5—2.5 厘米；小总苞片与总苞片同形，较花柄略长；小伞形花序有花 18—30；花柄长 2.5—3.5 毫米；花瓣白色，倒心形，长约 1 毫米，顶端有尾状内曲的小舌片，基部有爪；雄蕊长于花瓣，花药紫黑色。果实长圆形，长 3.5—4 毫米，果棱有翅，每棱槽有油管 3，合生面 6。花期 7—8 月，果期 9—10 月。

产陕西、湖北、四川、甘肃等省。生于海拔 3000—3600 米的山坡草地。模式标本采自陕西太白山。

全草入药，能温中，化食，止带，主治胃寒腹痛，腹胀，不思饮食，白带（陕西太白民间）。

6. 美丽棱子芹 图版 70

Pleurospermum amabile Craib ex W. W. Smith in Trans. Bot. soc. Edinb. 26: 154. 1913; Marq. in Journ. Linn. Soc. 48: 185. 1929.


多年生草本，高 20—40 厘米。根粗壮，直径 1—1.5 厘米，直伸，暗褐色。茎直立，带堇紫色，基部有褐色残存的叶鞘。3—4 回羽状复叶；基部叶柄长达 10 厘米，叶片轮廓宽三角形，长约 15 厘米，末回裂片狭卵形，长 1.5—2 厘米，边缘羽状深裂，裂片线形，长 1—2 毫米；上部叶柄逐渐变短或近于无柄；叶鞘膜质，近圆形或宽卵形，长 3—5 厘米，有美丽的紫色脉纹，边缘啮蚀状分裂。顶生伞形花序有总苞片 3—6，与上部叶同形，较小，顶端叶状分裂，边缘啮蚀状；伞辐 20—30，长约 4 厘米；小总苞片长圆形或倒披针形，长 6—10 毫米；白色膜质有紫色脉纹，边缘啮蚀状；花柄长约 5 毫米，花紫红色，萼齿明显，三角形；花瓣倒卵形，长约 1 毫米，基部有爪，顶端有小舌片，内曲；雄蕊长为花瓣的两倍，花药暗紫色。果实狭卵形，长约 0.5 毫米，果棱有明显的微波状齿，每棱槽有油管 3，合生面 6。花期 8—9 月，果期 9—10 月。

产西藏东部和云南西北部。生长于海拔 3600—5100 米的山坡草地或灌丛中。模式标本采自西藏亚东地区。

7. 泽库棱子芹(新种) 图版 71

Pleurospermum tsekuense Shan, sp. nov. in Addenda 299. 1979.

多年生直立草本，高 35—50 厘米，全体无毛，上部有分枝。根粗壮，有时分枝，颈部有



图版 70 美丽棱子芹 *Pleurospermum amabile* Craib ex W. W. Smith
 1. 植株下部；2. 植株上部；3. 花；4. 花瓣；5. 雄蕊；6. 果实；7. 分生果横剖面。（张大成绘）