

1—3, 线状披针形, 长约 5 毫米, 早落; 伞辐 10—17(23), 长 3—12 厘米; 小伞形花序直径 1—3 厘米, 有多数花; 小总苞片 4—5, 线形, 长 3—4 毫米; 花柄长 0.5—1 厘米; 萼齿卵状三角形; 花瓣淡黄色, 倒卵形, 长 1—1.5 毫米, 顶端渐尖或钝, 内折; 雄蕊的花丝内弯, 花药椭圆形, 黄色, 长约 1 毫米; 花柱 2, 短, 花柱基隆起, 略呈平压状。分生果近圆形, 长 5 毫米, 宽 4 毫米, 背腹稍压扁, 背棱、中棱及侧棱均扩展成翅, 但发展不均匀, 翅宽约 1 毫米; 油管明显, 每棱槽 3—4, 合生面 4; 胚乳内凹。花期 7 月, 果期 8—9 月。

产山西、陕西、湖北、四川、内蒙古、甘肃、青海等省区。生长于海拔 1700—4500 米的林缘及灌丛内。模式标本采自湖北。

1a. 卵叶羌活(植物分类学报)

Notopterygium forbesii de Boiss. var. **oviforme** (Shan) H. T. Chang, 张盍曾, 植物分类学报 13 (3): 85. 1975.——*Notopterygium oviforme* Shan in *Sinensia* 14: 112. 1943.

本变种基生叶常为二回三出式分裂, 末回裂片卵形至长圆状卵形, 大而质薄, 顶端裂片长 8—10 厘米, 宽 5—8 厘米, 边缘锯齿圆钝。伞辐 8—9。

产四川、陕西。生于山坡林下较阴湿处或林缘草丛中。


其根茎较松软, 药用价值不大。

2. 羌活(植物分类学报) 竹节羌活(四川马尔康)、蚕羌(青海) 图版 100

Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang, 中药志 1: 282, 图 183. 1959. *nom. nud.*; 张盍曾, 植物分类学报 13 (3): 85. 1975.

多年生草本, 高 60—120 厘米, 根茎粗壮, 伸长呈竹节状。根颈部有枯萎叶鞘。茎直立, 圆柱形, 中空, 有纵直细条纹, 带紫色。基生叶及茎下部叶有柄, 柄长 1—22 厘米, 下部有长 2—7 厘米的膜质叶鞘; 叶为三出式三回羽状复叶, 末回裂片长圆状卵形至披针形, 长 2—5 厘米, 宽 0.5—2 厘米, 边缘缺刻状浅裂至羽状深裂; 茎上部叶常简化, 无柄, 叶鞘膜质, 长而抱茎。复伞形花序直径 3—13 厘米, 侧生者常不育; 总苞片 3—6, 线形, 长 4—7 毫米, 早落; 伞辐 7—18(39), 长 2—10 厘米; 小伞形花序直径 1—2 厘米; 小总苞片 6—10, 线形, 长 3—5 毫米; 花多数, 花柄长 0.5—1 厘米; 萼齿卵状三角形, 长约 0.5 毫米; 花瓣白色, 卵形至长圆状卵形, 长 1—2.5 毫米, 顶端钝, 内折; 雄蕊的花丝内弯, 花药黄色, 椭圆形, 长约 1 毫米; 花柱 2, 很短, 花柱基平压稍隆起。分生果长圆状, 长 5 毫米, 宽 3 毫米, 背腹稍压扁, 主棱扩展成宽约 1 毫米的翅, 但发展不均匀; 油管明显, 每棱槽 3, 合生面 6; 胚乳腹面内凹成沟槽。花期 7 月, 果期 8—9 月。

产陕西、四川、甘肃、青海、西藏。生长于海拔 2000—4000 米的林缘及灌丛内。模式标本采自青海曲麻莱县。



图版 100 羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang

1. 根与根茎；2. 叶；3. 果序；4. 分生果(未成熟)；5. 分生果横剖面。(陈荣道绘)