

期7—8月。

产四川、云南。生于海拔3600—4000米的高山草坡或岩石隙缝中。

25. 紫伞芹属——*Melanosciadium* de Boiss.

de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 2 (2): 803. 1902.

多年生草本，根长圆锥形。茎直立，通常单生，极少有2个，带紫色，有多数分枝。下部叶有长柄，二回三出分裂。复伞形花序无总苞；伞辐短，不等长；小总苞片线形；花柄长短不一；通常无萼齿，或极细小；花瓣近圆形，向内弯曲呈兜状，顶端凹陷，内折的小舌片呈长方形，脉明显，深紫色。果实近圆球形，两侧扁压，果棱明显；花柱基扁圆锥形，边缘微波状，紫色，花柱与花柱基近等长，向两侧弯曲，紫色，棱槽中油管2—4，合生面6。

为我国西南地区的特有属，只1种，即紫伞芹 *M. pimpinelloideum* de Boiss.

本属与茴芹属 *Pimpinella* L. 相近，但本属的花瓣呈兜状，脉明显，花柱基扁圆锥形，边缘微波状。

1. 紫伞芹(拟) 山羌活(四川南川) 图版102

Melanosciadium pimpinelloideum de Boiss. in Bull. Herb. Boiss. 2 (2): 804. 1902.


高大草本，高0.5—2米。根粗壮，长15—20厘米，上部较粗，直径1—2厘米，表皮粗糙，有支根和须根。茎直立，直径3—10毫米。茎下部的叶片有长柄，长10—20厘米，基部有紫色的膜质叶鞘，二回三出分裂，一回羽片有2对裂片，下面一对有柄，长2—3厘米，两侧的末回裂片卵形或长卵形，长3—10厘米，宽2—6厘米，基部截形，中间的末回裂片菱形，长7—15厘米，宽3—9厘米，基部楔形，茎中上部的叶片1—2回三出分裂；茎上部的叶片3裂，全部裂片顶端短尾状，边缘有缺刻状锯齿，表面绿色，背面灰白色，两面沿叶脉有稀疏的细刚毛。花序梗上部密被卷曲的柔毛；伞辐5—14，长不足2厘米，有稀疏的或较密的柔毛；小总苞片5—10，不等长，短于或稍长于小伞形花序，或与小伞形花序近等长，有毛；小伞形花序有花10—20。幼果卵形，有毛，成熟的果实圆球形。花果期7—9月。

产于四川东部及贵州西北部。生于海拔1400—1800米，荫蔽潮湿的竹林中或林缘草地上。模式标本采自四川城口县。

26. 瘤果芹属——*Trachydium* Lindl.

Lindl. in Royle Illustr. Bot. Himal. Mount. 1: 232. 1835.

多年生草本，植株高30厘米以下，通常无毛或被短柔毛。根长圆锥形，很少为纺锤形，直伸或分出支根。茎单生，通常短缩，一般有分枝。基生叶有柄，基部有宽阔的膜质叶



图版 102 紫伞芹 *Melanosciadium pimpinelloideum* de Boiss.

1. 植株下部; 2. 植株上部; 3. 小总苞片; 4. 花; 5. 果序; 6. 果实; 7. 果实横剖面。(史渭清绘)