

本种与匍枝柴胡 *B. dalhousieanum* (C. B. Clarke) K.-Pol. 极近似, 区别在于总苞片较显著, 其中最长的一片往往超过较短的伞辐或与之等长; 小总苞片5, 长椭圆形, 顶端尾状长渐尖, 绿色。

10. 川滇柴胡(云南种子植物名录) 飘带草(昆明民间草药) 图版 126

*Bupleurum candollei* Wall. ex DC. Cat. n. 552. 1828, nomen nudum, Prodr. 4; 131. 1830; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2; 674. 1879; Wolff Engl. in Pflanzenr. 43 (IV. 228); 149. 1910; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7; 713. 1933; Nasir in Univ. Calif. Publ. Bot. 27 (7); 423. 1955; 单人骅、李颖, 植物分类学报 12(3); 275. 1974.

多年生草本, 高达1米, 根较发达, 木质化。茎基部坚硬, 粗可达1厘米, 多数分枝近水平伸出, 然后斜生, 枝基部坚硬, 中空并分出疏散的小枝。叶质薄, 表面绿色, 背面灰白绿色; 基生叶和茎下部叶线状披针形或长椭圆形, 长12—15厘米, 宽5—8毫米, 顶端圆钝, 有小突尖头, 11—15脉; 茎中部叶长圆形, 顶端圆钝, 有长突尖头, 基部狭窄成短叶柄, 11—13脉; 茎上部叶较短, 长圆形, 或倒狭卵形, 长1.5—4厘米, 宽0.8—1厘米, 顶端圆, 有突尖头, 基部楔形, 近无柄, 15—19脉。复伞形花序顶生和腋生, 直径2.5—4厘米; 伞辐4—8, 不等长, 纤细, 稍展开, 长1—3厘米; 总苞片3—5, 不等大, 卵形, 广卵形或近圆形, 长3—20毫米, 宽2—10毫米, 顶端圆或急尖, 常有小突尖头, 基部圆形, 稍狭, 7—17脉; 小总苞片5, 广椭圆形或近圆形, 长5—7毫米, 宽2—4毫米, 顶端圆或钝圆, 超过花一倍, 5—7脉; 小伞形花序直径8—12毫米, 有花10—15, 花柄长1毫米左右; 花瓣淡黄色, 上部内折后成扁圆形, 中肋部分色稍深, 不凸出, 舌片小方形, 顶端2裂; 花柱基深黄色, 直径超过子房。果棕褐色, 圆柱形, 长2.5毫米, 宽1.8毫米左右, 棱近狭翼状; 每棱槽油管3, 合生面4。花期7—8月, 果期9—10月。

产云南(镇康、大理、兰坪、嵩明、昆明)。生长于海拔1900—2900米的山坡草地及疏林中。分布亚洲中部、印度、尼泊尔等地。

全草入药, 消炎解毒, 祛风止痒。治疮毒疖子。内服煎汤, 外用煎水洗。

10a. 紫红川滇柴胡(植物分类学报)


*Bupleurum candollei* Wall. ex DC. var. *atropurpureum* C. Y. Wu, 单人骅、李颖, 植物分类学报 12(3); 275. 1974.

本变种除茎紫红色外, 总苞及小总苞均带紫红色, 质地较厚, 叶背不呈灰白绿色。花瓣暗紫色, 花柱基深紫色。

产云南镇康县。生长于海拔2900米草坡。模式标本采自云南镇康县雪山山脉。

10b. 多枝川滇柴胡(植物分类学报)

*Bupleurum candollei* Wall. ex DC. var. *virgatissimum* C. Y. Wu, 单人骅、李颖, 植物分类学报 12(3); 275. 1974.



图版 126 川滇柴胡 *Bupleurum candollei* Wall. ex DC.

1. 植株下部; 2. 植株上部; 3. 果序; 4. 小总苞片; 5. 花; 6. 幼果; 7. 幼果横剖面。(史渭清绘)